



## فصل اول

### «رفتار نابهنجار»

#### آزمون فصل اول

۱- کدام یک از ویژگی‌های زیر در تعریف رفتار نابهنجار قرار ندارند؟

- (۱) کمیابی آماری (۲) تخطی از هنجار (۳) قابل انتظار بودن (۴) ناتوانی و کژکاری

۲- کدام دیدگاه رفتار بهنجار را نتیجه نهایی سیستم‌های متعامل می‌داند؟

- (۱) بهنجاری به عنوان سلامت (۲) بهنجاری فرآیند  
(۳) بهنجاری متوسط (۴) بهنجاری آرمانی‌نگر

۳- دیدگاه بهنجاری به عنوان فرآیند در کدام یک از نظریه‌های زیر متجلی شده است؟

- (۱) فروید (۲) اریکسون (۳) اسپیرمن (۴) آدلر

۴- استفاده از ابزارهایی همچون MMPI یا آزمون وکسلر، مستلزم تبعیت از کدام دیدگاه بهنجاری است؟

- (۱) بهنجاری به عنوان سلامت (۲) به عنوان کمال مطلوب  
(۳) به عنوان متوسط (۴) به عنوان فرآیند

۵- «تداعی‌های آموخته شده» به عنوان عامل زمینه‌ساز اختلال، در کدام حیطه، علت‌های نابهنجاری می‌گنجد؟

- (۱) علت‌های زیستی (۲) علت‌های روانی  
(۳) علت‌های اجتماعی - فرهنگی (۴) علت‌های وراثتی



## فصل دوم

### «تاریخچه آسیب‌شناسی روانی»

#### آزمون فصل دوم

- ۱- کدام یک از موارد زیر جزء دسته‌بندی توجیحات اختلالات روانی نیست؟
- (۱) توجیه علمی (۲) توجیه فلسفی (۳) توجیه مرموز (۴) توجیه انسانی
- ۲- چه کسی اولین بار بین اختلال زوال عقل پیش‌رس و اختلال مانیک دپرسیو تمیز قائل شد؟
- (۱) شارکو (۲) مسمر (۳) کراپلین (۴) بقراط
- ۳- کدام دانشمند از شیوه‌ای روان‌شناختی برای هیپنوتیزم بیماران هیستریایی استفاده می‌کرد؟
- (۱) شارکو (۲) فروید (۳) مسمر (۴) بروئر
- ۴- طبقه‌بندی کلی بیماری‌های روانی به مانی، مالیخولیا و صرع از کیست؟
- (۱) کراپلین (۲) شارکو (۳) بقراط (۴) بروئر
- ۵- کراپلین علت کدام اختلال را ناشی از بی‌نظمی در سوخت و ساز می‌دانست؟
- (۱) زوال عقل پیش‌رس (۲) شیدایی - افسردگی (۳) مانیا (۴) هیستریک
- ۶- کدام یک از موارد زیر در انقلاب شناختی روان‌شناسی مرضی نقش داشت؟
- (۱) کشف روانکاوی (۲) کشف شرطی‌سازی (۳) کشف هیپنوتیزم (۴) کشف روان جراحی نوین
- ۷- پدر نورولوژی جدید چه کسی است؟
- (۱) بروئر (۲) مسمر (۳) فروید (۴) شارکو
- ۸- کدام یک از مفاهیم زیر به مفهوم از هم‌گسیختگی ژانه نزدیک است؟
- (۱) self در هم ریخته (۲) سرکوب (۳) جبر روانی (۴) همسان‌سازی با پرخاشگری
- ۹- چه کسی را می‌توان بانی تشخیص افتراقی دانست؟
- (۱) اریتانوس (۲) پنیل (۳) جالینوس (۴) بقراط
- ۱۰- روش پالایشی در درمان چه بیمارانی به کار می‌رفت و از کیست؟
- (۱) شارکو - هیستریک (۲) بروئر - هیستریک (۳) فروید - اضطرابی (۴) کراپلین - اسکیزوفرنی

## فصل سوم

## «ارزیابی»

## آزمون فصل سوم

۱- فرآیند شیوه‌های ارزیابی روان‌شناختی شامل کدام گزینه زیر می‌شود؟

- (۱) مصاحبه، آزمون، مشاهده  
(۲) مصاحبه، تشخیص، درمان  
(۳) ارزیابی روانی، ارزیابی بدنی، ارزیابی رفتاری  
(۴) ارزیابی فیزیولوژیکی، ارزیابی رفتاری، ارزیابی روانی

۲- هنگامی که در ارزیابی رفتار، محرک‌ها، وقوع رفتار را افزایش یا کاهش دهند از چه نوع ارزیابی استفاده شده است؟

- (۱) ارزیابی روان‌شناختی  
(۲) ارزیابی تحلیل کارکردی  
(۳) ارزیابی فیزیولوژیکی  
(۴) ارزیابی آسیب مغزی

۳- در راهنمای تشخیصی آماری (DSM-IV) برای تشخیص اختلال اضطرابی از چه نوع مصاحبه‌ای استفاده می‌شود؟

- (۱) SCID - I  
(۲) SCID - II  
(۳) SCID  
(۴) AIDS -IV

۴- کدام دسته‌بندی زیر نشان‌دهنده‌ی اختلال در فرآیند تفکر است؟

- (۱) انسداد فکری - حاشیه‌پردازی - هذیان  
(۲) انسداد فکری - حاشیه‌پردازی - تفکر مماسی  
(۳) حاشیه‌پردازی - تداعی صوتی - هذیان  
(۴) اشتغالات ذهنی - تداعی صوتی - افکار خودکشی

۵- در کدام مورد زیر بیمار افکار حاشیه‌ای را که تحت تأثیر محرک‌ها برانگیخته می‌شوند، تعقیب می‌نماید و هرگز به موضوع اولیه نمی‌رسد؟

- (۱) انسداد فکری  
(۲) حاشیه‌پردازی  
(۳) تفکر مماسی  
(۴) تداعی صوتی

۶- در معاینه وضعیت روانی، پرسش در مورد رویدادهای مهم چند ماه اخیر اشاره به سنجش کدام نوع حافظه دارد؟

- (۱) حافظه نزدیک  
(۲) حافظه دور  
(۳) حافظه گذشته نزدیک  
(۴) حافظه فوری

۷- اولین آزمون هوش در چه سالی و توسط چه کسی ساخته شد؟

- (۱) ۱۹۰۵ - ترمن  
(۲) ۱۹۰۵ - بینه  
(۳) ۱۹۱۵ - ترمن  
(۴) ۱۹۱۵ - بینه

۸- اصطلاح هوشبهر را اولین بار چه کسی و در چه سالی مطرح کرد؟

- (۱) اشترن - ۱۹۱۲  
(۲) بینه - ۱۹۱۶  
(۳) گالتون - ۱۹۰۶  
(۴) کتل - ۱۹۰۶

۹- ابداع‌گر روش هوشبهر انحرافی کیست؟

- (۱) بینه  
(۲) ترمن  
(۳) وکسلر  
(۴) کتل

۱۰- کدام دسته از آزمون‌های فرعی زیر جزء مقیاس‌های کلامی وکسلر است؟

- (۱) اطلاعات، فراخوانی ارقام، شباهت‌ها، محاسبه  
(۲) اطلاعات، فراخوانی ارقام، الحاق قطعات، مازها  
(۳) تکمیل تصاویر، واژگان، اطلاعات، محاسبه  
(۴) طراحی مکعب‌ها، واژگان، اطلاعات، محاسبه

۱۱- در پرسش‌نامه شخصیتی مینه‌سوتا، نشانه‌های وسواسی، ترس و خستگی مرتبط به کدام مقیاس است؟

- (۱) (pt)  
(۲) (pa)  
(۳) (pd)  
(۴) (sc)

۱۲- کدام یک از موارد زیر جزء مقیاس‌های پرسش‌نامه شخصیت NEO نیست؟

- (۱) برون‌گرایی  
(۲) روان‌رنجورخویی  
(۳) درون‌گرایی  
(۴) وظیفه‌شناسی

۱۳- در آزمون رورشاخ کدام مورد زیر جزء ملاک‌های نمره‌گذاری واکنش‌ها نیست؟

- (۱) جایگاه  
(۲) محتوا  
(۳) تأکید بر چرخش برگه  
(۴) عوامل تعیین‌کننده

۱۴- در آزمون رورشاخ «S» نشانه اختصاری کدام پاسخ است؟

- (۱) پاسخ کلی  
(۲) جزئیات  
(۳) ناحیه سفید  
(۴) عوامل جزئی غیرمعمول‌کننده

۱۵- علامت اختصاری Pd در MMPI نشان‌دهنده کدام مقیاس است؟

- (۱) پارانوئید  
(۲) پانیک  
(۳) افسردگی  
(۴) انحراف اجتماعی

- ۱۶- برای مشخص شدن تدافعی بودن مراجع، کدام مقیاس MMPI کاربرد دارد؟
- |       |        |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
| F (۴) | SC (۳) | K (۲) | L (۱) |
|-------|--------|-------|-------|
- ۱۷- MMPI چند مقیاس بالینی دارد؟
- |              |              |             |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| (۴) ۲۰ مقیاس | (۳) ۱۰ مقیاس | (۲) ۸ مقیاس | (۱) ۱۶ مقیاس |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
- ۱۸- کدام یک از خرده آزمون‌های وکسلر، رشد زبان و هوش کلی کلامی را می‌سنجد؟
- |                   |            |                   |                 |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| (۴) طراحی مکعب‌ها | (۳) محاسبه | (۲) اطلاعات عمومی | (۱) گنجینه لغات |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
- ۱۹- بهترین خرده آزمون وکسلر که به عامل g نیز نزدیک است، کدام است؟
- |            |               |            |                    |
|------------|---------------|------------|--------------------|
| (۴) واژگان | (۳) درک و فهم | (۲) محاسبه | (۱) فراخوانی ارقام |
|------------|---------------|------------|--------------------|
- ۲۰- کدام یک از آزمون‌های زیر، یک آزمون عینی شخصیت نیست؟
- |         |         |         |           |
|---------|---------|---------|-----------|
| CPI (۴) | EPQ (۳) | HIT (۲) | 16-PF (۱) |
|---------|---------|---------|-----------|
- ۲۱- در کار تشخیص و درمان، ارزیابی فیزیولوژیکی از طریق کدام تست میسر است؟
- |               |           |                    |                  |
|---------------|-----------|--------------------|------------------|
| (۴) آزمون TAT | (۳) وکسلر | (۲) آزمون‌های هوشی | (۱) هالستیدریتان |
|---------------|-----------|--------------------|------------------|
- ۲۲- MMPI چند ماده دارد؟
- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| (۴) ۳۱۲ | (۳) ۴۴۶ | (۲) ۵۶۶ | (۱) ۶۵۰ |
|---------|---------|---------|---------|
- ۲۳- تست ۱۶ عاملی شخصیت را چه کسی ساخت؟
- |         |              |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|
| (۴) کتل | (۳) مک کینلی | (۲) یونگ | (۱) موری |
|---------|--------------|----------|----------|
- ۲۴- آزمون رورشاخ به ترتیب چند کارت رنگی و سیاه و سفید دارد؟
- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| (۴) ۶-۴ | (۳) ۵-۵ | (۲) ۷-۳ | (۱) ۴-۶ |
|---------|---------|---------|---------|
- ۲۵- کدام یک از موارد زیر از مقیاس‌های عملی وکسلر نیست؟
- |                    |              |               |                  |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| (۴) فراخوانی ارقام | (۳) نمادیابی | (۲) رمزگردانی | (۱) تکمیل تصاویر |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|

## فصل چهارم

## «تشخیص، طبقه‌بندی و درمان»

## آزمون فصل چهارم

- ۱- در راهنمای تشخیص و آماری (DSM) محور IV چه موضوعی را بررسی می‌کند؟  
 (۱) اختلالات بالینی (۲) مشکلات روانی اجتماعی (۳) اختلالات شخصیت (۴) اختلالات جسمانی
- ۲- کدام ویژگی DSM پایایی فرآیند تشخیص را در بالینگران افزایش می‌دهد؟  
 (۱) رویکرد توصیفی (۲) رویکرد طبقه‌بندی (۳) ملاک تشخیصی (۴) توصیف منظم
- ۳- در راهنمای تشخیص آماری (DSM - IV) ارزیابی بر اساس پیوستاری، معرف کدام ویژگی آن است؟  
 (۱) مدل طبقه‌بندی (۲) مدل آماری (۳) مدل بُعدی (۴) مدل رفتاری
- ۴- کدام ویژگی (DSM - IV) اختلالات را بر حسب خصوصیات مانده سن، فرهنگ، شیوع و بروز توصیف می‌کند؟  
 (۱) رویکرد توصیفی (۲) رویکرد طبقه‌بندی (۳) ملاک تشخیصی (۴) توصیف منظم
- ۵- تقسیم‌بندی کلی اختلالات روانی در (DSM - IV) شامل کدام دسته‌بندی زیر است؟  
 (۱) پسیکوز - روان‌نژندی - بیماری کنشی - بیماری ارگانیک  
 (۲) اختلالات بالینی - شخصیت - جسمانی - مشکلات روانی اجتماعی  
 (۳) پسیکوز - روان‌نژندی - اختلال بالینی - بیماری عضوی  
 (۴) اختلالات بالینی - شخصیت - جسمانی - روان‌نژندی
- ۶- اختلالات تجزیه‌ای و شبه‌جسمانی جزء کدام دسته از اختلالات هستند؟  
 (۱) سایکوز (۲) کنشی (۳) نوروژ (روان‌نژندی) (۴) ارگانیک
- ۷- مشکلات عمده فرد در مدرسه جزو کدام یک از محورهای DSM جای می‌گیرد؟  
 (۱) محور II (۲) محور III (۳) محور IV (۴) محور V
- ۸- DSM-II براساس کدام سیستم تدوین شد؟  
 (۱) نظام کراپلین (۲) نظام پنیل (۳) ICD (۴) نظام زوبین
- ۹- اختلال اسکیزوئید و لورنس بیدل مون در کدام یک از محورهای DSM جای می‌گیرد؟  
 (۱) I-IV (۲) IV-I (۳) II-I (۴) II-II
- ۱۰- آگورافوبی جزء کدام یک از اختلالات زیر طبقه‌بندی می‌شود؟  
 (۱) افسردگی (۲) اضطرابی (۳) سایکوتیک (۴) شخصیت



## فصل پنجم

### «علائم و نشانه‌ها در روان‌پزشکی»

#### آزمون فصل پنجم

۱- این عقیده که دیگران صدای فکر من را می‌شنوند، کدام هذیان است؟

- (۱) ربایش  
(۲) کنترل  
(۳) انتشار  
(۴) نفوذ

۲- کوماویژیل یعنی هنگامی که .....

- (۱) فرد در حال توهم است.  
(۲) فرد در حال هذیان است.  
(۳) فرد در رؤیا به سر می‌برد.  
(۴) فرد در خواب است، اما آماده بیدار شدن است.

۳- کدام یک از اختلالات هشیاری بیشتر در سالمندان دیده می‌شود؟

- (۱) اغتشاش شعور  
(۲) غروب‌زدگی  
(۳) حالت رؤیاگونه  
(۴) حالت شفقی

۴- حالت هیجانی‌کند همراه با گسستگی یا بی‌تفاوتی را ..... گویند.

- (۱) apathy  
(۲) panic  
(۳) ambivalence  
(۴) anhedonia

۵- منفی‌کاری (negativism) جزء کدام یک از اختلالات روانی است؟

- (۱) هشیاری  
(۲) رفتار حرکتی  
(۳) تفکر  
(۴) ادراک

۶- Phobia جزو کدام دسته از اختلالات روانی محسوب می‌شود؟

- (۱) سایکوز  
(۲) نوروز  
(۳) ارگانیک  
(۴) هر سه مورد

۷- در صورت بروز اختلال موقعیت‌سنجی، احتمال بروز اختلال در کدام یک از موارد زیر محتمل‌تر است؟

- (۱) مکان  
(۲) زمان  
(۳) شخص  
(۴) احتمال مساوی برای تمام موارد

۸- اگر فردی که قبلاً اختلال موقعیت‌سنجی داشته است و اکنون بیماریش رو به بهبود است، آخرین بُعدی که طبیعی می‌شود، کدام است؟

- (۱) مکان  
(۲) زمان  
(۳) شخص  
(۴) گزینه ۱ و ۳

۹- کدام اختلال مترادف صرع پارسیل مرکب است؟

- (۱) کوماویژیل  
(۲) حالت شفقی  
(۳) آلکسی تایمی  
(۴) حالت رؤیاگونه

۱۰- alogia در کدام اختلال دیده می‌شود؟

- (۱) PTSD  
(۲) دمانس  
(۳) MPD  
(۴) دو قطبی نوع I

۱۱- کدام یک از اختلالات زیر بیشتر همراه با علائم نباتی دیده می‌شود؟

- (۱) مالیخولیا  
(۲) مانیا  
(۳) تبدیلی  
(۴) اسکیزوفرنی

۱۲- کدام یک از موارد زیر در اسکیزوفرنی کمتر دیده می‌شود؟

- (۱) apathy  
(۲) anhedonia  
(۳) panic  
(۴) ambivalence

۱۳- انعطاف مومی شکل بیشتر در کدام اختلال دیده می‌شود؟

- (۱) وسواسی جبری  
(۲) مانیا  
(۳) هیستری  
(۴) اسکیزوفرنی

۱۴- به فردی که خبر بدی شنیده و قوام عضلانی‌اش را از دست داده است، کدام حالت اطلاق می‌شود؟

- (۱) کاتاتونیا  
(۲) کاتاپلکسی  
(۳) آکینزی  
(۴) اکوپراکسی

۱۵- mutism در کدام اختلال شایع‌تر است؟

- (۱) تبدیلی (۲) گریز تجزیه‌ای (۳) دیس‌تایمی (۴) سندرم pms

۱۶- astasia در کدام اختلال شایع‌تر است؟

- (۱) اضطراب (۲) مانیا (۳) هیستری تبدیلی (۴) اسکیزوفرنی

۱۷- کدام علامت در اختلالات اکستراپیرامیدال دیده می‌شود؟

- (۱) کاتالپسی (۲) آپراکسی (۳) آتاکسی (۴) دیس‌کینزی

۱۸- کدام یک از موارد زیر جزء اختلالات فرم فکر نیست؟

- (۱) هرزه‌گویی (۲) حاشیه‌پردازی (۳) پالی‌لالی (۴) وقفه

۱۹- بیماری که به سؤال پزشک جملات متعدد بدون ارتباط با موضوع را می‌دهد، کدام اختلال را می‌توان به وی نسبت داد؟

- (۱) پرش افکار (۲) تفکر مماسی (۳) حاشیه‌پردازی (۴) ادغام

۲۰- اختلالات فرم فکر بیشتر در کدام اختلالات دیده می‌شوند؟

- (۱) اضطرابی (۲) دوقطبی (۳) اسکیزوفرنی (۴) اختلالات شخصیت

۲۱- کدام یک از اختلالات زیر در مانیا شایع‌تر است؟

- (۱) درجاماندگی (۲) خروج از خط (۳) پالی‌لالی (۴) پرش افکار

۲۲- کدام هذیان در زنان شایع‌تر است؟

- (۱) هذیان پخش (۲) حسادت هذیانی (۳) هذیان بی‌وفایی (۴) جنون جنسی

۲۳- به نظر شما کدام هذیان، غیرغریب است؟

- (۱) انتساب به خود (۲) گزند و آسیب (۳) نهلیستیک (۴) پخش فکر

۲۴- افرادی که از حضور در اتاق‌های در بسته و آسانسور می‌ترسند، مبتلا به کدام هراس‌اند؟

- (۱) کلاستروفوبی (۲) گزنوفوبی (۳) آکروفوبی (۴) Pan Phobia

۲۵- ناتوانی در ادراک حسی کدام است؟

- (۱) distonia (۲) aphasia (۳) agnosia (۴) apraxia



## فصل ششم

### «دیدگاه‌های نظری»

#### آزمون فصل ششم

- ۱- فروید کدام قسمت از دستگاه روانی را «دیگ جوشان» نامید؟  
 (۱) نهاد (۲) نیمه‌خودآگاه (۳) من (۴) هشیار (خودآگاهی)
- ۲- به عقیده‌ی فروید مخزن غرایز و انرژی در کدام قسمت است؟  
 (۱) نهاد (۲) فرامن (۳) من (۴) هشیار (خودآگاهی)
- ۳- در دیدگاه فروید کدام قسمت نیروهای قضاوت، حافظه و ادراک را به فرد می‌دهد؟  
 (۱) نهاد (۲) فرامن (۳) من (۴) هشیار (خودآگاهی)
- ۴- به عقیده‌ی فروید کدام قسمت ذهن در ۶ ماه دوم زندگی شروع به تکوین می‌کند؟  
 (۱) نهاد (۲) فرامن (۳) من (۴) هشیار (خودآگاهی)
- ۵- نظریه‌ی روابط ابژه (موضوعی) به تبعیت از کدام دیدگاه «روابط ابژه» نامیده شد؟  
 (۱) اریکسون (۲) فروید (۳) یونگ (۴) هارتمن
- ۶- در دیدگاه روان‌کاوی مهم‌ترین بحران زندگی فرد در چه مرحله‌ای رخ می‌دهد؟  
 (۱) احلیلی (۲) نهفتگی (۳) دهانی (۴) مقعدی
- ۷- کدام‌یک از نظریات زیر به اینتروکوسم (فضای روان‌شناختی در درون هر فرد) می‌پردازد؟  
 (۱) روان‌کاوی (۲) انسانگرایی (۳) روان‌پویشی نوین (۴) روان‌شناسی فردی
- ۸- در سلسله مراتب نیازهای مازلو بعد از نیاز به احترام چه نیازی قرار دارد؟  
 (۱) نیاز شناختی (۲) نیاز به تعلق و محبت (۳) نیاز زیبایی‌شناختی (۴) نیاز به خودشکوفایی
- ۹- کدام‌یک از خانواده‌درمانگران روی فرآیندهای ناهشیار و هیجانی خانواده‌ها تأکید می‌کنند؟  
 (۱) مینوچین (۲) جی‌هیلی (۳) ویتاگر (۴) ستیر
- ۱۰- کدام‌یک از دیدگاه‌های زیر به روابط قدرت در خانواده تأکید می‌کند؟  
 (۱) رویکرد بین‌نسلی (۲) رویکرد ساختاری (۳) رویکرد راهبردی (۴) رویکرد تجربه‌ای
- ۱۱- کدام‌یک از موارد زیر جزء فرض‌های زیربنایی رفتارگرایی محسوب نمی‌شود؟  
 (۱) محیط‌گرایی (۲) آزمایشگری (۳) کشف خود (۴) خوش‌بینی به تغییر
- ۱۲- کاربرد درمان‌های پاولفی برای چه اختلالاتی مفید است؟  
 (۱) پس‌یکوتیک (۲) اضطرابی (۳) شخصیت (۴) خلقی
- ۱۳- براساس کدام دیدگاه «نشانه‌ی اختلال خود اختلال است»؟  
 (۱) رفتاری (۲) شناختی (۳) زیست‌شناختی (۴) روان‌کاوی
- ۱۴- رویدادی که حذف آن احتمال وقوع دوباره‌ی پاسخی که قبل از آن واقع شده را افزایش می‌دهد، تعریف کدام مورد زیر است؟  
 (۱) تقویت‌کننده‌ی منفی (۲) تقویت‌کننده‌ی نخستین (۳) تقویت‌کننده‌ی مثبت (۴) تقویت‌کننده‌ی ثانوی
- ۱۵- کدام‌یک از نظریه‌پردازان زیر بر جنبه‌های شناختی و نمادین یادگیری تأکید می‌کند؟  
 (۱) بندورا (۲) اسکینر (۳) بک (۴) الیس



کله ۱۶- در مدل شناختی (ABC) علامت (A) نشان‌دهنده‌ی چیست؟

- (۱) تجربه فعال‌ساز (۲) فرهنگ (۳) پیامدها (۴) عقاید غیرمنطقی

کله ۱۷- اصلی‌ترین موضوع مطرح شده در سبب‌شناسی آلزایمر کدام است؟

- (۱) فقر اجتماعی (۲) کاهش استیل کولین (۳) افزایش استیل کولین (۴) نقش خانواده

کله ۱۸- نقش دوپامین بیشتر در سبب‌شناسی کدام اختلالات مطرح شده است؟

- (۱) اسکیزوفرنی - آلزایمر (۲) آلزایمر - کلاین لوین (۳) اسکیزوفرنی - پارکینسون (۴) پارکینسون - کلاین لوین

کله ۱۹- در خواب REM، EEG کدام موج را ثبت می‌کند؟

- (۱) آلفا (۲) بتا (۳) دلتا (۴) تتا

کله ۲۰- در پیدایش فراخود کدام مورد نقش اصلی را دارد؟

- (۱) همانندسازی با والد همجنس (۲) همانندسازی با والد غیرهمجنس (۳) فرآیند رسش (۴) فرهنگ



## فصل هفتم

### «مکانیسم‌های دفاعی»

#### آزمون فصل هفتم

کله ۱- تنها مکانیسم دفاعی هشیار کدام است؟

(۱) فرونشانی (۲) سرکوب (۳) برگشت (۴) فرافکنی

کله ۲- کدام یک از دفاع‌های زیر مضمونی نزدیک به تحریف شناختی «همه یا هیچ» دارد؟

(۱) فرافکنی (۲) همانندسازی (۳) والایش (۴) دونیم‌سازی

کله ۳- کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی با مفهوم ریا رابطه نزدیکی دارد؟

(۱) همانندسازی (۲) والایش (۳) واکنش وارونه (۴) درون‌فکنی

کله ۴- مکانیسم «والایش» ممکن است در کدام گروه از افراد زیر وجود داشته باشد؟

(۱) قاتلان بی‌رحم (۲) ورزشکاران (۳) جنگ‌طلبان (۴) افراد معتاد

کله ۵- کدام یک از اختلالات زیر در مبتلایان به اختلال هیستری دیده می‌شود؟

(۱) تجزیه (۲) پیش‌بینی (۳) عقلانی‌سازی (۴) فرافکنی

کله ۶- کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی زیر از سوی آنافرود مطرح شد؟

(۱) والایش (۲) ریاضت‌ورزی (۳) فرافکنی (۴) کنش‌نمایی

کله ۷- در کدام مکانیسم دفاعی دقت به جزئیات زیادتر می‌شود؟

(۱) انکار (۲) درون‌فکنی (۳) جداسازی (مجزاسازی) (۴) تجزیه

کله ۸- مکانیسم دفاعی عمده بیماران شخصیت مرزی کدام است؟

(۱) دونیم‌سازی (۲) جداسازی (۳) فرافکنی (۴) عقلی‌سازی

کله ۹- در دوران نوجوانی استفاده از کدام مکانیسم دفاعی برای افرادی که میل به استقلال بیشتری دارند و توجه زیادی نیز به جنس مخالف ندارند،

شایع‌تر است؟

(۱) شوخی (۲) واپس‌رانی (۳) برگشت (۴) ریاضت‌ورزی

کله ۱۰- فردی که عادت به کتک‌کاری‌های پی‌درپی و آزار و اذیت بی‌دلیل می‌کند، به احتمال زیاد از کدام مکانیسم استفاده می‌کند؟

(۱) دونیم‌سازی (۲) کنش‌نمایی (۳) جسمانی‌سازی (۴) فرافکنی

## فصل هشتم

## «اختلالات اضطرابی»

## آزمون فصل هشتم

- ۱- ویژگی‌های همچون ترس از حضور در استادبوم، مغازه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و سالن‌های تئاتر از ویژگی کدام اختلال است؟  
 (۱) هراس اجتماعی (۲) آگورافوبی (۳) کلاستوفوبی (۴) اضطراب فراگیر
- ۲- کدام گزینه در مورد فرض فروید در مورد اضطراب صحیح است؟  
 (۱) واکنش نسبت به محرک مشخص و درونی (۲) واکنش نسبت به محرک ناخودآگاه و درونی  
 (۳) واکنش نسبت به محرک مشخص و بیرونی (۴) واکنش نسبت به محرک ناخودآگاه و بیرونی
- ۳- لوکوس سرولئوس با کدام ناقل عصبی شناخته می‌شود؟  
 (۱) سروتونین (۲) دوپامین  
 (۳) نوراپی نفرین (۴) گابا
- ۴- کدام ناقل عصبی در اضطراب نقش ندارد؟  
 (۱) گابا (۲) سروتونین (۳) نوراپی نفرین (۴) استیل کولین
- ۵- تحریک کدام ناحیه مغزی سبب ایجاد ترس و پرخاشگری می‌شود؟  
 (۱) قشر مخ (۲) لوب پیشانی (۳) آمیگدال (۴) سپتال
- ۶- کدام ناقل عصبی بیشترین نقش را در حملات پانیک دارد؟  
 (۱) گابا (۲) گلوتامات (۳) دوپامین (۴) نوراپی نفرین
- ۷- اختلال در سینگولیت در کدام اختلال نقش دارد؟  
 (۱) PTSD (۲) OCD (۳) اضطراب فراگیر GAD (۴) هراس
- ۸- ناتوان کننده‌ترین فوبیا کدام نوع است؟  
 (۱) هراس اختصاصی (۲) هراس اجتماعی (۳) آگورافوبی (۴) هر سه مورد
- ۹- در تشخیص افتراقی پانیک با GAD باید کدام مورد در نظر گرفته شود؟  
 (۱) تعداد علائم (۲) شروع تدریجی (۳) شروع ناگهانی (۴) ماندگاری زیاد علائم
- ۱۰- شایع‌ترین اختلال روانی در زنان کدام اختلال است؟  
 (۱) افسردگی (۲) هراس اختصاصی (۳) اسکیزوفرنی (۴) هراس اجتماعی
- ۱۱- (مهاری شدگی رفتاری در برابر غریبه) مختص به کدام اختلال است؟  
 (۱) هراس (۲) اضطراب فراگیر (۳) افسردگی (۴) پانیک
- ۱۲- نگرش پادهراسانه به کدام مکانیسم دفاعی زیر شباهت دارد؟  
 (۱) واپس رانی (۲) جابه‌جایی (۳) همانندسازی با پرخاشگر (۴) عقلانی‌سازی
- ۱۳- حساسیت‌زدایی منظم برای درمان کدام اختلال مؤثرتر است؟  
 (۱) اضطراب (۲) هراس (۳) افسردگی (۴) PTSD
- ۱۴- حساسیت‌زدایی و بازپردازش حرکات چشم، در مورد درمان کدام اختلال به کار می‌رود؟  
 (۱) اوتسم (۲) OCD (۳) PTSD (۴) شخصیت ضد اجتماعی
- ۱۵- شباهت‌های اختلالات PTSD، پانیک و اضطراب فراگیر به هم کدام مورد است؟  
 (۱) وجود احساس گناه (۲) اختلال در حافظه  
 (۳) انگ‌بختگی دستگاه خودمختار (۴) شروع ناگهانی



## فصل نهم

### «نشانه جسمانی و اختلالات مرتبط»

#### آزمون فصل نهم

- ۱- کدام یک از علائم زیر، جزء شایع‌ترین علائم اختلال تبدیلی نیستند؟
- (۱) کوری (۲) فلج (۳) موتیسم (۴) اختلال حافظه
- ۲- بی‌حسی دستکشی مربوط به کدام اختلال است؟
- (۱) تبدیلی (۲) درد روانزاد (۳) تجربه‌ای (۴) توره
- ۳- (abasia – astasi) مربوط به کدام جنبه اختلال تبدیلی است؟
- (۱) علائم حسی (۲) علائم حرکتی (۳) تشنج (۴) هیچ کدام
- ۴- نفع اولیه و نفع ثانویه مشخصه کدام اختلال است؟
- (۱) اختلال تجزیه‌ای (۲) اختلال ساختگی (۳) تبدیلی (۴) اسکیزوفرنی
- ۵- تشخیص افتراقی اختلال تبدیلی و جسمانی‌سازی کدام مورد است؟
- (۱) اختلال جسمانی‌سازی بیماری حاد است. (۲) اختلال تبدیلی علائم متعددی دارد.  
(۳) اختلال تبدیلی سیر مزمنی دارد. (۴) اختلال تبدیلی به صورت حاد شروع می‌شود.
- ۶- اظهار این جمله از سوی پزشک چه تأثیری در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی دارد؟
- (علائم خیالی هستند و زاده خیال شما هستند)
- (۱) اغلب وضع این بیماران را بدتر می‌کند. (۲) اغلب تأثیری مثبت در فرد دارد.  
(۳) بستگی به وضع بیمار دارد. (۴) بستگی به تخصص پزشک دارد.
- ۷- چه کسی اختلال بدریخت‌انگاری بدن را شناسایی کرد و آن را هراس از بدریختی نامید؟
- (۱) پیرزانه (۲) فروید (۳) شارکو (۴) کراپلین
- ۸- وجه افتراق اختلال جسمانی‌سازی از سایر اختلالات شبه‌جسمی در چیست؟
- (۱) تعدد شکایات و دستگاه‌های متعدد درگیر (۲) فقدان نقص و نارسایی آشکار  
(۳) تعابیر غیرواقعی و نادرست علائم جسمی (۴) ترس از ابتلاء به یک بیماری جدی
- ۹- نام اولیه کدام یک از اختلالات زیر هیستری بوده است؟
- (۱) تبدیلی (۲) تجزیه‌ای (۳) هیپوکندریازیس (۴) درد روانزاد
- ۱۰- بی‌حسی و دید تونلی از نشانه‌های کدام یک از اختلالات شبه‌جسمی است؟
- (۱) جسمانی‌سازی (۲) تبدیلی (۳) هیپوکندریازیس (۴) درد روانزاد
- ۱۱- طبق (DSM) علامت‌های اختلال جسمانی‌سازی چیست؟
- (۱) ۴ نشانه درد، ۲ نشانه گوارشی، ۱ نشانه جنسی، ۱ نشانه شبه‌عصبی  
(۲) ۴ نشانه درد، ۱ نشانه گوارشی، ۲ نشانه جسمی، ۲ نشانه شبه‌عصبی  
(۳) یک یا دو علامت نورولوژیک  
(۴) ۲ نشانه درد، ۲ نشانه گوارشی، ۱ نشانه جنسی، شبه‌عصبی ندارد.
- ۱۲- در کدام یک از ویژگی‌های اختلال تبدیلی فرد مبتلا با کنار زدن تعارض‌های درونی از خود آگاهی به نفع دست می‌یابد؟
- (۱) نفع ثانویه (۲) نفع اولیه (۳) بی‌تفاوتی زیبا (۴) همانند سازی

- ۱۳- در کدام یک از اختلالات زیر فرد مبتلا از رویدادهای طبیعی بدن سوء تعبیر می‌کند و شکایات شکمی در آن شایع است؟
- (۱) تبدیلی (۲) جسمانی‌سازی (۳) خودبیمارانگاری (۴) بدریخت‌انگاری بدن
- ۱۴- چه کسی اختلال بدریخت‌انگاری بدن را به مقوله «شرم داشتن از بدن خود» توصیف می‌کند؟
- (۱) پیرژانه (۲) کراپلین (۳) فروید (۴) کلاین
- ۱۵- نامگذاری اختلال درد ایدئوپاتییک و اختلال آتیپیک مربوط به کدام یک از اختلالات زیر است؟
- (۱) درد روانزاد (۲) بدریخت‌انگاری بدن (۳) تبدیلی (۴) خودبیمارانگاری
- ۱۶- در کدام اختلال «بستری شدن و نقش بیمار را بازی کردن» هدف اولیه است؟
- (۱) خودبیمارانگاری (۲) ساختگی (۳) درد روانزاد (۴) دگرسان‌بینی خود
- ۱۷- کدام اختلال به نام سندرم مونچهاوزن (سندرم بیمار حرفه‌ای) معروف است؟
- (۱) خودبیمارانگاری (۲) ساختگی (۳) بدریخت‌انگاری بدن (۴) درد روانزاد
- ۱۸- علائم تمارض کاذب به کدام یک از اختلالات زیر مربوط می‌شود؟
- (۱) ساختگی (۲) تبدیلی (۳) خودبیمارانگاری (۴) تجزیه‌ای
- ۱۹- شخصیت‌انگاری از ویژگی‌های بارز کدام اختلال است؟
- (۱) ساختگی (۲) خودبیمارانگاری (۳) تبدیلی (۴) تجزیه‌ای
- ۲۰- اختلال تمارض به کدام یک از سندرم‌های زیر نزدیک است؟
- (۱) سندرم ترنر (۲) سندرم داون (۳) سندرم بریکه (۴) سندرم گانسر
- ۲۱- در کدام اختلال، عمداً مادر آسیب‌های دردناکی به کودک خود تحمیل می‌کند؟
- (۱) ساختگی (۲) مونشهاوزن نیابتی (۳) اسکیزوفرنی (۴) تجزیه‌ای
- ۲۲- افراد مبتلا به کدام اختلال به احتمال زیاد با انواع بیماری‌ها و علائم آن آشنا هستند؟
- (۱) گانسر (۲) شخصیت‌ضداجتماعی (۳) ساختگی (۴) شخصیت‌مرزی
- ۲۳- اختلال ساختگی در کدام گروه شایع‌تر است؟
- (۱) بزهکاران (۲) افراد متأهل (۳) افراد مجرد (۴) دانشجویان
- ۲۴- از لحاظ علائم کدام اختلال شبیه اختلال ساختگی است؟
- (۱) اسکیزوفرنی (۲) گانسر (۳) PTSD (۴) شخصیت‌وسواسی
- ۲۵- شکم شبیه تخته رخت‌شویی در کدام اختلال دیده می‌شود؟
- (۱) وسواسی - جبری (۲) تبدیلی (۳) ساختگی (۴) جسمانی‌سازی



## فصل دهم

### «اختلالات تجزیه‌ای»

#### آزمون فصل دهم

۱- ویژگی اساسی فراموشی تجزیه‌ای کدام است؟

- (۱) فراموشی پیش‌گستر  
(۲) فراموشی پس‌گستر  
(۳) اختلال در جهت‌یابی  
(۴) ناتوانی در بیاد آوردن اطلاعات مهم شخصی

۲- اگر بیماری در یک محاسبه ریاضی ساده  $2+2$  را ۵ بگوید و پایتخت آمریکا را نیویورک بداند، مبتلا به کدام اختلال است؟

- (۱) مسخ شخصیت  
(۲) هیستری  
(۳) سندرم گانسر  
(۴) هویت تجزیه‌ای

۳- کدام گزینه در مورد شستشوی مغزی صحیح است؟

- (۱) جزء اختلالات تجزیه‌ای است.  
(۲) جزء اسکیزوفرنی است.  
(۳) نوعی هیستری است.  
(۴) هیچ‌کدام اختلال روانی محسوب نمی‌شود.

۴- کدام یک از مؤلفه‌های زیر تجربه اختلال مسخ شخصیت را در بر نمی‌گیرد؟

- (۱) احساس تغییرات بدنی  
(۲) احساس جدایی از دیگران  
(۳) دگرسان بینی محیط (مسخ واقعیت)  
(۴) تجربه خود به عنوان مشاهده‌گر

۵- کدام یک از تعاریف زیر مربوط به اختلال گریز تجزیه‌ای است؟

- (۱) نسبت به تاریخچه زندگی فراموشی کامل دارند، ولی به صورت هدفمند عمل می‌نمایند.  
(۲) وجود دو یا چند هویت جدید.  
(۳) از دست دادن هویت شخصی بدون جایگزینی هویتی دیگر.  
(۴) خود را مکانیکی، در خواب یا گسسته از بدن می‌داند.

۶- اختلال مبهم که مشخصه آن ارائه پاسخ‌های تقریبی همراه با تیرگی هوشیاری است؟

- (۱) سندرم گانسر  
(۲) سندرم خاطره‌ی باز یافته  
(۳) سندرم وانگوک  
(۴) فراموشی تجزیه‌ای

۷- فرار روان‌زاد در DSM-5 از کدام اختلال است؟

- (۱) فراموشی تجزیه‌ای  
(۲) MPD  
(۳) مسخ  
(۴) بریک

۸- در سبب‌شناسی اختلال هویت تجزیه‌ای منظور از الگوی T چیست؟

- (۱) تأکید روان‌کاوی بر آسیب  
(۲) تأکید رفتار درمانی بر آسیب  
(۳) تأکید درمان‌های شناختی و رفتاری بر آسیب  
(۴) تأکید گروه درمانی بر آسیب

۹- تحقیقات چه کسی به مطرح شدن بیشتر اختلال شخصیت چندگانه انجامید؟

- (۱) فروید  
(۲) کلکلی  
(۳) کلافت  
(۴) لوینسون

۱۰- کدام یک از شخصیت‌های زیر می‌تواند به عنوان شخصیت دوم از سوی بیماران MPD انتخاب شود؟

- (۱) منشی محل کار  
(۲) برادر کوچک‌تر  
(۳) شخصیت‌های معلول  
(۴) معلم دوران دبیرستان

## فصل یازدهم

## «وسواس و اختلالات وابسته»

## آزمون فصل یازدهم

- ۱- اختلال وسواس موکنی از کدام طبقه وارد این مبحث شده است؟  
 (۱) اختلالات تجزیه‌ای (۲) کنترل تکانه (۳) اضطرابی (۴) شخصیت
- ۲- اختلال احتکار سابقاً و در DSM.IV:  
 (۱) یک اختلال مجزا محسوب می‌شود. (۲) علامتی از اختلال وسواسی جبری بود.  
 (۳) مطرح نبود. (۴) جز منطقه اختلال کنترل تکانه بود.
- ۳- اختلال پوست کنی سابقاً جزء کدام طبقه از اختلالات بود؟  
 (۱) تجزیه‌ای (۲) کنترل تکانه (۳) اضطرابی (۴) شخصیت
- ۴- اختلال بدریخت انگاری سابقاً جزء کدام طبقه اختلالات بود؟  
 (۱) تجزیه‌ای (۲) شبه جسمی (۳) کنترل تکانه (۴) شخصیت
- ۵- کدام اختلال هم‌بندی بالایی با اختلال تیک دارد؟  
 (۱) بدریخت انگاری (۲) OCD (۳) احتکار (۴) پوست کنی
- ۶- مشمولیت ذهنی با احساس نقص در بدن مشخصه کدام اختلال است؟  
 (۱) OCD (۲) hoarding (۳) بدریخت انگاری (۴) اضطراب بیماری
- ۷- اختلال بدریخت انگاری، یک نوع فرعی به نام بدریخت انگاری ..... دارد.  
 (۱) صورت (۲) هیکل (۳) عضله (۴) بینی
- ۸- جمع‌آوری مفرط اشیایی که موردنیاز نیستند، مشخصه کدام اختلال است؟  
 (۱) OCD (۲) excoriation (۳) hoarding (۴) هر سه مورد
- ۹- تریکو تیلومانی یعنی ....  
 (۱) احتکار (۲) بدریخت انگاری (۳) وسواس موکنی (۴) وسواس پوست کنی
- ۱۰- انتقال‌دهنده کلیدی در بحث وسواس کدام است؟  
 (۱) گابا (۲) استیل کولین (۳) سروتونین (۴) نوراپی‌نفرین



## فصل دوازدهم

### «طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک»

#### آزمون فصل دوازدهم

- ۱- مخرب‌ترین بیماری روانی کدام است؟  
 (۱) افسردگی (۲) اختلالات شبه‌جسمی (۳) اختلالات تجزیه‌ای (۴) اسکیزوفرنی
- ۲- اصطلاح (دمانس پری کاکس) از کیست؟  
 (۱) کراپلین (۲) مورای (۳) یاسپرس (۴) بلولر
- ۳- اصطلاح اسکیزوفرنی از کیست؟  
 (۱) بلولر (۲) فروید (۳) کراپلین (۴) آدلف مایر
- ۴- علت اسکیزوفرنی از نظر چه کسی اساساً اختلال مغز است؟  
 (۱) فروید (۲) بلولر (۳) کراپلین (۴) کارل یاسپرس
- ۵- از نظر بلولر کدام‌یک از علائم زیر جزء علامت‌های بنیادین اسکیزوفرنی نیست؟  
 (۱) اوتیسم (۲) تداعی (۳) توهم (۴) دودلی
- ۶- از نظر کرچمر کدام‌یک از سنخ‌های بدنی زیر مستعد اسکیزوفرنی نیستند؟  
 (۱) آستینک (۲) آتلتیک (۳) دیسپلاستیک (۴) پیکنیک
- ۷- بانی زیست‌شناسی روانی کیست؟  
 (۱) یاسپرس (۲) آدلف مایر (۳) کراپلین (۴) پیرژانه
- ۸- شیوع اسکیزوفرنی چند درصد جامعه است؟  
 (۱) ۱ درصد (۲) ۲ درصد (۳) ۳ درصد (۴) ۵ درصد
- ۹- کدام‌یک از موارد زیر در مورد شیوع و پیش‌آگهی اسکیزوفرنی در بین دو جنس صحیح نیست؟  
 (۱) شیوع اسکیزوفرنی در مردان و زنان مساوی است.  
 (۲) پیش‌آگهی مردان در کل بهتر از زنان است.  
 (۳) زنان بهتر از مردان به دارو درمانی پاسخ می‌دهند.  
 (۴) مردان بیشتر از زنان ممکن است دچار علائم منفی شوند.
- ۱۰- کدام‌یک از موارد زیر در مورد اسکیزوفرنی صحیح است؟  
 (۱) وراثت تأثیری در ابتلا به اسکیزوفرنی ندارد.  
 (۲) هیچ همبستگی بین تولد در فصل زمستان و بهار و بروز اسکیزوفرنی کافی نیست.  
 (۳) میزان باروری اسکیزوفرن‌ها در حدود جمعیت عمومی است.  
 (۴) بین تراکم جمعیت و اسکیزوفرنی رابطه‌ای نیست.
- ۱۱- از نظر چه کسی اسکیزوفرنی نتیجه واپس‌روی و تثبیت است؟  
 (۱) ماهر (۲) یونگ (۳) فروید (۴) مورای
- ۱۲- از نظر چه کسی اسکیزوفرنی نتیجه تحریف بین‌ارتباط نوزاد و مادر است؟  
 (۱) آنا فروید (۲) بالبی (۳) ماهر (۴) ژاک لکان
- ۱۳- در کدام‌یک از رویکردهای زیر هذیان‌ها جایگزین احساسات حقارت می‌شوند؟  
 (۱) یادگیری (۲) شناختی (۳) روانکاوی (۴) پدیدارشناسی
- ۱۴- فرضیه تعهد دوگانه مربوط به ویژگی‌های خانواده، مرتبط با کدام‌یک از اختلالات روانی است؟  
 (۱) اضطراب (۲) افسردگی (۳) اسکیزوفرنی (۴) اختلالات گسستی



۱۵- فرضیه خانواده گسیخته و یکسویه از کیست؟

- (۱) بیتسون (۲) جکسن (۳) لیدز (۴) واین

۱۶- کدام محقق فرضیه «تعهد دوگانه» را مطرح ساخت؟

- (۱) تنودرلیدز (۲) جکسن و بیتسون (۳) آلپورت (۴) یاسپرس

۱۷- کدام ناقل عصبی بیشترین اثر را در بروز اسکیزوفرنی دارد؟

- (۱) گابا (۲) نوراپی نفرین (۳) گلوتامات (۴) دوپامین

۱۸- دوپامین با کدام یک از علائم اسکیزوفرنی رابطه فراوان دارد؟

- (۱) منفی (۲) مثبت (۳) اختلال فکر (۴) اختلال حافظه

۱۹- طبق فرضیات موجود، سروتونین در بروز کدام یک از علامت‌های اسکیزوفرنی نقش دارد؟

- (۱) منفی (۲) مثبت (۳) اختلال حافظه (۴) ۲ و ۳

۲۰- در مبحث سبب‌شناسی اسکیزوفرنی کدام یک از موارد زیر نقش فراوان دارد؟

- (۱) کم‌کاری قطعه پیش‌پیشانی (۲) کوچک شدن بطن‌های مغز (۳) کاهش دوپامین (۴) EEG غیرطبیعی

۲۱- (فرضیه بزرگی بطن‌ها) مربوط به کدام یک از اختلالات روانی است؟

- (۱) اختلالات خلقی (۲) اسکیزوفرنی (۳) اختلالات تجزیه‌ای (۴) اختلالات شبه‌جسمی

۲۲- ویژگی‌های همچون (توهم و هذیان‌های نظام‌دار) مربوط به کدام یک از انواع اسکیزوفرنی است؟

- (۱) پارانوئید (۲) کاتاتونیک (۳) آشفته (۴) هر سه مورد

۲۳- ویژگی آشکار نوع آشفته اسکیزوفرنی کدام است؟

- (۱) وجود هذیان (۲) وجود توهم (۳) حماقت و گسیختگی آشکار (۴) بهت (استوپر)

۲۴- منابع ایگو در کدام یک از انواع اسکیزوفرنی غنی‌تر از سایر انواع است؟

- (۱) پارانوئید (۲) کاتاتونیک (۳) آشفته (۴) باقیمانده

۲۵- شایع‌ترین نوع اسکیزوفرنی که در نوجوانی بروز می‌کند، کدام است؟

- (۱) پارانوئید (۲) کاتاتونیک (۳) آشفته (۴) باقیمانده

۲۶- از نظر ابتلا، کدام نوع از اسکیزوفرنی در سنین بالاتری بروز می‌کند؟

- (۱) پارانوئید (۲) کاتاتونیک (۳) آشفته (۴) باقیه‌ای

۲۷- توهم جزء کدام یک از اختلالات زیر است؟

- (۱) اختلالات فکر (۲) اختلالات ادراکی (۳) اختلالات شکل فکر (۴) اختلال جریان فکر

۲۸- هذیان جزء کدام یک از اختلالات زیر است؟

- (۱) اختلال جریان فکر (۲) اختلال محتوای فکر (۳) اختلال شکل فکر (۴) اختلال ادراکی

۲۹- شکل‌گیری خانواده درمانی بیشتر برای کمک به خانواده کدام یک از بیماران اختلالات روانی بود؟

- (۱) شخصیت مرزی (۲) هیستری (۳) دمانس (۴) اسکیزوفرنی

۳۰- کدام گزینه در مورد داروهای آنتی‌سایکوتیک کلاسیک صحیح است؟

- (۱) آگونیست استیل کولین (۲) آگونیست دوپامین (۳) آنتاگونیست استیل کولین (۴) آنتاگونیست دوپامین

۳۱- وجود علائم روان‌پریشانه در طول مدت بین یک تا شش ماه، تشخیص کدام اختلال داده می‌شود؟

- (۱) اسکیزوفرنی (۲) اسکیزوافکتیو (۳) اسکیزوفرنی فرم (۴) اختلال هذیانی



۳۲- وجود اختلال خلقی و خصایص اسکیزوفرنی، علائم کدام اختلال است؟

- (۱) اختلال دو قطبی (۲) اسکیزوفرنی فرم (۳) اسکیزوافکتیو (۴) اختلال هذیانی

۳۳- کدام گزینه در مورد اختلال اسکیزوافکتیو صحیح است؟

- (۱) شیوع بیشتر در مردان (۲) سن شروع در زنان بیشتر از مردان  
(۳) شیوع بیشتر در زنان (۴) سن شروع در مردان بیشتر از زنان

۳۴- وجود هذیان‌های غیرغریب، بدون بروز توهمات نظام یافته و رفتارهای آشفته، علائم کدام اختلال است؟

- (۱) اختلال روان‌پریشی گذرا (۲) اختلال هذیانی (۳) اختلال اسکیزوافکتیو (۴) اختلال روان‌پریشی نامعین

۳۵- غیرغریب بودن هذیان به چه معناست؟

- (۱) امکان رخ دادن آن وضعیت در زندگی (۲) امکان رخ ندادن آن وضعیت در زندگی  
(۳) هذیانی که در افراد دیگر دیده شده است. (۴) هذیانی که در افراد دیگر بسیار دیده شده است.

۳۶- در سبب‌شناسی اختلال هذیانی کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) آسیب به قشر مخ (۲) آسیب به قطعه پیشانی و گیجگاهی  
(۳) آسیب به غدد درون‌ریز (۴) آسیب به دستگاه لیمبیک

۳۷- مکانیسم‌های دفاعی عمده در اختلال هذیانی کدام است؟

- (۱) فرافکنی و انکار و واکنش وارونه (۲) فرافکنی و جابه‌جایی و دلیل‌تراشی  
(۳) فرافکنی و واپس‌زنی (۴) فرافکنی و عقلانی‌سازی

۳۸- علامت کلاسیک اختلال هذیانی کدام گزینه است؟

- (۱) حسادت (۲) خودبزرگ‌بینی (۳) پوچ‌گرایی (۴) گزند و آسیب

۳۹- سندرم اتللو نام دیگر کدام نوع هذیان است؟

- (۱) پوچ‌گرایی (۲) حسادت (۳) جسمانی (۴) گزند و آسیب

۴۰- روان‌پریشی خویشتن‌بینانه جزء کدام اختلال است؟

- (۱) اسکیزوفرنی (۲) اختلال هذیانی (۳) روان‌پریشی گذرا (۴) اتوسکوپی

## فصل سیزدهم

## «اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی و انواع آن»

## آزمون فصل سیزدهم

- ۱- اگر روان‌درمانی به تنهایی روش انتخابی درمان افسردگی باشد، کدام نوع درمان مؤثرترین است؟  
 (۱) روانکاوی (۲) رفتاردرمانی (۳) شناخت‌درمانی (۴) درمان بین فردی
- ۲- در درمان روانکاوی تأکید بر ..... است.  
 (۱) تقویت مثبت (۲) حل تعارض‌های درونی (۳) تمرکز بر احساسات (۴) تمرکز بر زمان حال
- ۳- نخستین و قدیمی‌ترین داروها برای درمان افسردگی کدام است؟  
 (۱) ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای (۲) مهارکننده باز جذب دوپامین (۳) ایمی‌پرامین (۴) بوپروپیون
- ۴- شکل خفیف‌تر اختلال دوقطبی کدام اختلال است؟  
 (۱) دیس‌تایمی (۲) سیکلوتایمی (۳) هیپومانیا (۴) افسردگی اساسی
- ۵- دوره افسردگی باید حداقل چند مدت طول بکشد تا تشخیص افسردگی اساسی گذاشته شود؟  
 (۱) دو هفته (۲) چهار هفته (۳) دو ماه (۴) دو سال
- ۶- در مورد شیوع اختلال دوقطبی I کدام مورد صحیح است؟  
 (۱) شایع در زنان (۲) شایع در مردان (۳) شایع در هر دو جنس (۴) بسته به فرهنگ
- ۷- شاه علامت زیستی پاسخ به استرس کدام مورد است؟  
 (۱) افزایش نوراپی‌نفرین (۲) افزایش فعالیت هیپوفیز (۳) افزایش فعالیت محور HPA (۴) افزایش دوپامین
- ۸- کدام گزینه در مورد وضعیت خواب مبتلایان به افسردگی صحیح نیست؟  
 (۱) کاهش حجم کلی خواب (۲) افزایش بیداری شبانه (۳) افزایش خواب REM (۴) کاهش خواب REM
- ۹- کدام‌یک از ناحیه‌های مغزی زیر در تنظیم هیجانات طبیعی نقشی ندارند؟  
 (۱) قشر جلو پیشانی (۲) سینگولای قدامی (۳) عقده‌های پایه (۴) هیپوکامپ
- ۱۰- در حالت تندچرخشی وقوع کدام اختلال شرط تشخیص است؟  
 (۱) مانیا (۲) افسردگی (۳) مانیا - افسردگی (۴) مالیخولیا
- ۱۱- مهم‌ترین استرس محیطی مرتبط با افسردگی کدام است؟  
 (۱) از دست دادن شغل (۲) مرگ والدین (۳) مرگ همسر (۴) ابتلا به سرطان
- ۱۲- احساسات خشم متوجه خود برای توضیح سبب‌شناسی کدام اختلال بود؟  
 (۱) پرخاشگری (۲) اضطراب (۳) افسردگی (۴) روان‌پریشی
- ۱۳- چه کسی افسردگی را ابراز پرخاشگری به ابژه محبوب می‌دانست؟  
 (۱) فروید (۲) بالبی (۳) هورنای (۴) یاکوبسن
- ۱۴- نظریه درماندگی آموخته‌شده از سوی چه کسی ارائه شد؟  
 (۱) بک (۲) کتل (۳) سلیگمن (۴) راجرز
- ۱۵- کاهش وزن، بی‌لذتی شدید و افکار خودکشی مربوط به کدام اختلال است؟  
 (۱) اختلال دوقطبی I (۲) اختلال دوقطبی II (۳) مالیخولیا (۴) SAD
- ۱۶- ملال هیستروئید نام دیگر کدام اختلال است؟  
 (۱) افسردگی اساسی (۲) دیس‌تایمی (۳) سیکلوتایمی (۴) افسردگی آتیپیک



۱۷- کدام گزینه در مورد وقوع مالیخولیا صحیح است؟

- (۱) به ندرت به وقوع می‌پیوندد.  
(۲) هراس و فرار از مدرسه از نشانه‌های آن است.  
(۳) افسردگی درون‌زاد خوانده می‌شود.  
(۴) بسته به فرهنگ، قومیت و خانواده است.

۱۸- اعوجاج‌های شناختی به چه معناست؟

- (۱) توجه مثبت به دنیا  
(۲) توجه به جنبه‌های منفی وقایع  
(۳) آینده‌نگری  
(۴) توجه بیش از حد به گذشته

۱۹- کدام یک از موارد زیر از نظر بک از علت‌های افسردگی نیست؟

- (۱) ترس از آینده  
(۲) احمق پنداشتن خود  
(۳) فقدان اوان زندگی  
(۴) تحریف شناختی

۲۰- علت اصلی افسردگی از نگاه بک کدام است؟

- (۱) از دست دادن امید  
(۲) تقویت نشدن  
(۳) از دست دادن محبوب  
(۴) انتظار ناکامی

## فصل چهاردهم

## «اختلالات جنسی»

## آزمون فصل چهاردهم

- ۱- تمایلات جنسی هر شخص به کدام عامل ربط ندارد؟  
 (۱) هویت جنسی (۲) جنسیت (۳) گرایش جنسی (۴) سطح تحصیلات
- ۲- اختلال در برداشت فرد از مذکر یا مونث بودن خود چه نامیده می‌شود؟  
 (۱) اختلال عملکرد جنسی (۲) نارضایتی جنسی (۳) اختلال روانی - جنسی (۴) اختلال هویت جنسی
- ۳- به احساس مردانگی یا زنانگی هر فرد از خود چه می‌گویند؟  
 (۱) نقش جنسی (۲) هویت جنسی (۳) گرایش جنسی (۴) رفتار جنسی
- ۴- اختلال ملال جنسی در DSM-5 جایگزین کدام عنوان شده است؟  
 (۱) اختلال میل جنسی (۲) زودانزالی (۳) انصراف جنسی (۴) اختلال هویت جنسی
- ۵- چه کسی بین جنسیت اجتماعی و جنسیت زیستی تمایز قائل شد؟  
 (۱) فروید (۲) استولر (۳) کراپلین (۴) پیرزانه
- ۶- کدام ناحیه مستقیماً در کارکرد جنسی نقش دارد؟  
 (۱) قشر مخ (۲) ساقه مغز (۳) غدد فوق کلیوی (۴) لیمبیک
- ۷- افزایش کدام انتقال‌دهنده عصبی اثر مهاری در کارکرد جنسی دارد؟  
 (۱) استیل کولین (۲) سروتونین (۳) نوراپی نفرین (۴) گلوتامات
- ۸- عامل کلیدی انگیختگی جنسی در زنان کدام است؟  
 (۱) دوپامین (۲) پروژسترون (۳) استروژن (۴) سروتونین
- ۹- همانندسازی با والد جنس مخالف از سوی کودک، در بزرگسالی باعث ایجاد چه اختلال جنسی می‌شود؟  
 (۱) اختلال هویت جنسی (۲) انحراف جنسی (۳) اختلال در رفتار جنسی (۴) هر سه مورد
- ۱۰- شایع‌ترین کژکاری‌های جنسی در مردان کدام موضوع است؟  
 (۱) اختلال میل جنسی (۲) انگیختگی جنسی (۳) ملال جنسیتی (۴) انزال زودرس
- ۱۱- کدام مورد مهم‌ترین عامل در کسب نقش مناسب با جنس است؟  
 (۱) ژنتیک (۲) عوامل زیستی - عصبی (۳) یادگیری (۴) هر سه مورد
- ۱۲- در تشخیص بچه‌بازی سن فرد بیمار باید حداقل چند ساله باشد؟  
 (۱) ۱۰ (۲) ۱۶ (۳) ۲۳ (۴) ۳۶
- ۱۳- کدام هورمون اغلب در پانزده روز دوم قاعدگی (ماهانه) ترشح می‌شود و در رفتار جنسی نقش بازدارنده دارد؟  
 (۱) استروژن (۲) پروژسترون (۳) تستوسترون (۴) هر سه مورد
- ۱۴- در رفتار جنسی زنان کدام ناحیه مغزی نقش فعال دارد؟  
 (۱) هسته‌های بطنی میانی هیپوتالاموس (۲) هسته‌های جانبی تالاموس (۳) هسته‌های جانبی هیپوتالاموس (۴) هسته‌های میانی تالاموس
- ۱۵- به نظر فروید علت پایین بودن میل جنسی کدام است؟  
 (۱) مهار در مرحله فالیک (۲) مهار در مرحله نهفتگی (۳) مهار در مرحله بلوغ (۴) مهار در مرحله دهانی



## فصل پانزدهم

### «اختلالات تغذیه و خوردن»

#### آزمون فصل پانزدهم

- ۱- اختلال در تصویر بدن ویژگی کدام اختلال است؟
- (۱) پارانوئید (۲) دمانس (۳) نمایشی (۴) بی‌اشتهایی
- ۲- اختلال در قاعدگی زنان بیشتر در کدام اختلال پدیدار می‌شود؟
- (۱) پراشتهایی عصبی (۲) بی‌اشتهایی عصبی (۳) دمانس (۴) دلیریوم
- ۳- کدام یک از اختلالات زیر به طور عمده در بیماران مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی، دیده می‌شود؟
- (۱) افسردگی (۲) کورساکوف (۳) آلزایمر (۴) PTSD
- ۴- کدام یک از موارد زیر یک علت اثبات شده در بی‌اشتهایی عصبی مردان مطرح شده است؟
- (۱) طبقه بالای اجتماعی (۲) فقر (۳) همجنس‌گرایی (۴) تخریب تالاموس
- ۵- نقش کدام ناقل عصبی در اختلالات خوردن مشهود است؟
- (۱) سروتونین (۲) گلوتامات (۳) GABA (۴) گلیسین
- ۶- کدام گزینه اغلب در مورد شیوع بی‌اشتهایی عصبی صحیح است؟
- (۱) شایع‌تر در دختران (۲) شایع‌تر در پسران (۳) شایع‌تر در زنان (۴) شایع‌تر در مردان
- ۷- یکی از علل سایکودینامیک بی‌اشتهایی عصبی کدام است؟
- (۱) رفتاری نمایشی (۲) نشانه‌ی اعتراض به مشکلات پیشین (۳) خواهان استقلال (۴) میل به همجنس
- ۸- پراشتهایی عصبی چه تفاوتی با بی‌اشتهایی عصبی دارد؟
- (۱) پرخوری (۲) بالا آوردن غذای خورده شده (۳) استفاده از ملین (۴) هیکل نه چندان لاغر
- ۹- کدام یک از داروهای زیر خط مقدم درمان بی‌اشتهایی عصبی است؟
- (۱) آنتی‌سایکوتیک (۲) ضدافسردگی (۳) ضداضطراب (۴) ضد صرع
- ۱۰- مهم‌ترین درمان پرخوری عصبانی کدام است؟
- (۱) روان‌کاوی (۲) CBT (۳) دارودرمانی (۴) ECT

## فصل شانزدهم

## «اختلالات خواب و بیداری»

## آزمون فصل شانزدهم

- ۱- تفاوت خواب REM (متناقض) و NREM کدام مورد است؟  
 (۱) فعالیت مغزی و فیزیولوژیک در NREM بالاتر است.  
 (۲) نبض و تنفس و فشار خون در REM بالاتر است.  
 (۳) مصرف اکسیژن NREM بالاتر است.  
 (۴) نعوظ جنسی در مردان در NREM رخ می‌دهد.
- ۲- عمیق‌ترین بخش‌های خواب در کدام مراحل اتفاق می‌افتد؟  
 (۱) مرحله ۱ و ۲ (۲) مرحله ۳ و ۴ (۳) مرحله ۳ و ۴ (۴) REM
- ۳- اگر فرد نیم تا یک ساعت پس از به خواب رفتن بیدار شود، کدام مورد زیر اتفاق می‌افتد؟  
 (۱) اتفاقی غیرطبیعی نمی‌افتد. (۲) اختلال در موقعیت‌سنجی (۳) فراموشی نسبی (۴) خواب‌گردی
- ۴- خواب NREM پس از چند دقیقه به REM انتقال می‌یابد (دوران نهفتگی طبیعی)؟  
 (۱) ۷۰ تا ۸۰ دقیقه (۲) ۸۰ تا ۱۰۰ دقیقه (۳) ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه (۴) ۷۰ تا ۱۰۰ دقیقه
- ۵- خواب REM و NREM به ترتیب، چند درصد از زمان خواب را تشکیل می‌دهد؟  
 (۱) ۳۵ و ۶۵ (۲) ۵۰ و ۵۰ (۳) ۲۵ و ۷۵ (۴) ۱۵ و ۸۵
- ۶- نقش استیل‌کولین در خواب چیست؟  
 (۱) تأثیری ندارد. (۲) ایجاد REM (۳) ایجاد NREM (۴) سرکوب خواب
- ۷- ساعت زیستی بدن کدام مورد است؟  
 (۱) لوکوس سرولتوس (۲) هسته فوق کیاسمایی (چلیپا) (۳) لیمبیک (۴) عقده‌های پایه (قاعده‌ای)
- ۸- محرومیت از خواب سبب بروز کدام رفتار می‌شود؟  
 (۱) آشفتگی ایگو و توهمات (۲) اضطراب (۳) افسردگی و هراس (۴) روان‌پریشی
- ۹- بدون علائم بیرونی، ساعت طبیعی بدن، دوره‌ای چند ساعته را دنبال می‌کند؟  
 (۱) ۲۳ ساعت (۲) ۲۴ ساعت (۳) ۲۵ ساعت (۴) ۲۶ ساعت
- ۱۰- قوام‌باختگی (کاتا‌پلکسی) و بروز ناگهانی عناصر خواب با REM در مورد انتقال بین خواب و بیداری در چه موقعیتی اتفاق می‌افتد؟  
 (۱) اختلال خواب مرتبط با تنفس (۲) پرخوابی اولیه (۳) پرخوابی ثانویه (۴) حمله‌ی خواب
- ۱۱- از خواب پریدن ناگهانی، نشناختن اطرافیان و به یاد نیاموردن اتفاقات بعد از بیدار شدن، نشانه‌ی کدام اختلال است؟  
 (۱) خواب‌گردی (۲) خواب‌گرفتگی (۳) خواب‌آلودگی (۴) وحشت شبانه
- ۱۲- میزان هیپوکرتین در تشخیص و بروز کدام اختلال مؤثر است؟  
 (۱) نارکولپسی (۲) کابوس (۳) insomnia (۴) خواب‌گردی
- ۱۳- کدام یک از اختلالات خواب همراه با اورا (خبردهنده) است؟  
 (۱) وحشت شبانه (۲) نارکولپسی (۳) سومنابولیسیم (۴) بی‌خوابی اولیه
- ۱۴- مشخصه اصلی اختلال خواب مرتبط با تنفس کدام است؟  
 (۱) انقطاع خواب (۲) وقوع کابوس (۳) خواب‌گردی (۴) دوره کوتاه REM
- ۱۵- تشخیص افتراقی اختلال کابوس و اختلال وحشت شبانه چیست؟  
 (۱) وحشت شبانه در REM رخ می‌دهد. (۲) کابوس در REM رخ می‌دهد.  
 (۳) بعد از وقوع کابوس فرد از محتوای آن اطلاعی ندارد. (۴) کابوس در NREM رخ می‌دهد.



## فصل هفدهم

## «اختلالات اخلاک، کنترل تکانه و سلوک»

## آزمون فصل هفدهم

- کله ۱- جنون دزدی جزء کدام یک از اختلالات زیر است؟  
 (۱) اختلالات شخصیت (۲) کنترل تکانه (۳) اختلالات شناختی (۴) تجزیه‌ای
- کله ۲- بیماران مبتلا به کدام اختلال بعد از انجام یک عمل، به شدت احساس پشیمانی و گناه می‌کنند؟  
 (۱) شخصیت ضد اجتماعی (۲) سلوک (۳) ADHD (۴) کنترل تکانه
- کله ۳- بین پرخاشگری تکانشی و کدام انتقال‌دهنده ارتباط وجود دارد؟  
 (۱) دوپامین (۲) گابا (۳) استیل‌کولین (۴) سروتونین
- کله ۴- تستوسترون چه ارتباطی با رفتار بیماران کنترل تکانه دارد؟  
 (۱) افزایش هذیان (۲) کاهش خلق (۳) افزایش پرخاشگری (۴) افزایش اضطراب
- کله ۵- در کدام یک از اختلالات زیر تنها نفس انجام دادن یک عمل مهم است و هدف چندانی دربر ندارد؟  
 (۱) جنون دزدی (۲) اختلال ساختگی (۳) اختلال تمارض (۴) اختلال تبدیلی
- کله ۶- کدام یک از اختلالات زیر جزء اختلالات کنترل تکانه نیست؟  
 (۱) کلیتومانی (۲) ایگومانی (۳) پیرومانی (۴) اختلال انفجاری متناوب
- کله ۷- دستبردهای مکرر در کدام اختلال دیده می‌شود؟  
 (۱) انفجاری متناوب (۲) پیرومانی (۳) کلیتومانی (۴) قماربازی بیمارگون
- کله ۸- شخصیت شبه‌صرعی به مبتلایان به کدام اختلال اطلاق می‌شود؟  
 (۱) پیرومانی (۲) وسواس‌کنند مو (۳) جنون دزدی (۴) انفجاری متناوب
- کله ۹- تریکوبزوار در کدام اختلال دیده می‌شود؟  
 (۱) وسواس‌کنند مو (۲) جنون دزدی (۳) انفجاری متناوب (۴) پیرومانی
- کله ۱۰- کدام یک از سندرم‌های زیر به اختلال انفجاری متناوب شبیه است؟  
 (۱) کوتار (۲) آموک (۳) آنجلمن (۴) کاپگراس



## فصل هجدهم

## «اختلالات مرتبط با آسیب (تروما) و عامل استرس‌زا»

## آزمون فصل هجدهم

- ۱- واکنش هیجانی غیرمعمول به یک رویداد استرس‌زا اغلب به کدام اختلال منجر می‌شود؟  
 (۱) اختلالات شناختی (۲) اختلالات شخصیت (۳) اختلالات کنترل تکانه (۴) اختلالات انطباق
- ۲- کدام یک از عوامل محیطی می‌تواند به اختلال انطباق منجر شود؟  
 (۱) جنگ (۲) تجاوز (۳) مرگ همسر (۴) زخمی شدن در یک تصادف
- ۳- علائم اختلال سازگاری باید حداکثر چند مدت بعد از وجود عامل استرس‌سور ایجاد شوند؟  
 (۱) یک ماه (۲) دو ماه (۳) سه ماه (۴) چهار ماه
- ۴- در سبب‌شناسی اختلال انطباق، کدام مورد نقش بارزتری دارد؟  
 (۱) عوامل محیطی (۲) عوامل ارگانیک (۳) عوامل وراثتی (۴) هر سه مورد
- ۵- در تشخیص افتراقی اختلال سازگاری، کدام یک از اختلالات زیر مطرح است؟  
 (۱) OCD (۲) MPD (۳) ADHD (۴) PTSD
- ۶- تشخیص افتراقی اختلال سازگاری و اختلال استرس پس از سانحه بر اساس کدام مورد زیر امکان‌پذیر است؟  
 (۱) مدت بیماری (۲) ماهیت استرس (۳) شخصیت زمینه‌ای بیمار (۴) سن شروع بیماری
- ۷- شاخص اساسی اختلال سازگاری (Adjustment disorder) چیست؟  
 (۱) بروز علائم در طول مدت ۴ ماه از شروع یک حادثه تروماتیک  
 (۲) بروز علائم در طول مدت ۳ ماه از شروع یک حادثه استرس‌زا  
 (۳) بروز علائم در طول مدت ۲ ماه از شروع یک حادثه تروماتیک  
 (۴) بروز علائم در طول مدت ۱ ماه از شروع یک حادثه استرس‌زا
- ۸- خانم شصت ساله‌ای در گوشه پیاده‌رو یکی از خیابان‌های تهران روزنامه می‌فروشد. او در فصل زمستان به علت سرما و ریزش برف و باران و آلودگی هوا نمی‌تواند به کار همیشگی خود ادامه دهد، در نتیجه شرایط اقتصادی و خانوادگی وی متزلزل شده و سه هفته است که احساس غمگینی دارد، حوصله کسی را ندارد و روابط خانوادگی وی مختل شده است. دلش به هیچ کاری نمی‌رود، خوابش کم شده و اشتهايش هم کاهش یافته است. تشخیص شما کدام‌یک از اختلالات زیر است:  
 (۱) MDD, Seasonal Pattern (۲) adjustment disorder with depressed mood  
 (۳) MDD, Melancholic Feature (۴) Dysthymic disorder
- ۹- فردی که بعد از ورشکستگی مالی علائم افسردگی را از خود نشان می‌دهد، تشخیص کدام اختلال را به ذهن متبادر می‌کند؟  
 (۱) PTSD (۲) اختلال انطباق (۳) افسردگی اساسی (۴) افسرده‌خویی
- ۱۰- کدام یک از علائم زیر در اختلال سازگاری وجود دارد؟  
 (۱) اضطراب (۲) افسردگی (۳) هذیان (۴) هر سه مورد



## فصل نوزدهم

### «اختلالات شخصیت»

#### آزمون فصل نوزدهم

- ۱- کدام یک از ویژگی‌های زیر در مورد اختلال شخصیت نادرست است؟  
 (۱) علائم برون‌دگرساز است.  
 (۲) این افراد پرتوقع و اعصاب‌خردکن‌اند.  
 (۳) خودناهمخوان  
 (۴) خودهمخوان
- ۲- طبق DSM کدام یک از اختلالات شخصیت در دسته C قرار ندارند؟  
 (۱) شخصیت دوری‌گزین (۲) وابسته  
 (۳) خودشیفته (۴) وسواسی - جبری
- ۳- کدام یک از اختلالات زیر با اختلالات مربوط به مصرف الکل ارتباط دارد؟  
 (۱) مرزی (۲) ضد اجتماعی (۳) نمایشی (۴) پارانوئید
- ۴- افسردگی علاوه بر سابقه خانوادگی، بیشتر در کدام اختلال بروز می‌کند؟  
 (۱) وابسته (۲) اسکیزوئید (۳) مرزی (۴) خودشیفته
- ۵- کوتاه بودن نهفتگی REM و غیر طبیعی بودن نتایج آزمون دگزامتازون در کدام اختلال شخصیت اتفاق می‌افتد؟  
 (۱) پارانوئید (۲) وسواسی - جبری (۳) نمایشی (۴) وابسته
- ۶- تغییرات در EEG در کدام اختلال شخصیت دیده می‌شود؟  
 (۱) پارانوئید و اسکیزوئید (۲) نمایشی (۳) وابسته (۴) مرزی و ضد اجتماعی
- ۷- اصطلاح زره‌منش را چه کسی وضع کرد؟  
 (۱) فروید (۲) رایش (۳) کراپلین (۴) آدلر
- ۸- برای کمک به اختلالات شخصیت از دید روان‌پویشی، نخست چه اقدامی لازم است؟  
 (۱) شناخت فرهنگ بیمار (۲) مصاحبه با اطرافیان (۳) شناخت دفاع‌های زیربنایی (۴) مروری بر اهداف بیمار
- ۹- چهار قطب اصلی زندگی از دیدگاه روان‌پویشی، کدام است؟  
 (۱) مکانیسم‌های دفاعی، وجدان، ایگو و خاطرات  
 (۲) ایگو، سوپرایگو، خاطرات و واقعیت  
 (۳) غریزه، مکانیسم‌های دفاعی، وجدان و ایگو  
 (۴) غریزه، واقعیت، افراد مهم و وجدان
- ۱۰- (دوستان خیالی) در مبتلایان به کدام اختلال شخصیت دیده می‌شود؟  
 (۱) پارانوئید (۲) اسکیزوئید (۳) اسکیزوتایپی (۴) نمایشی
- ۱۱- شخصیت‌های نمایشی از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌کنند؟  
 (۱) تجزیه (۲) خیال‌پردازی (۳) فرافکنی (۴) دونیم‌سازی
- ۱۲- همانندسازی برون‌فکنانه، ساز و کار اصلی کدام اختلال شخصیت است؟  
 (۱) مرزی (۲) نمایشی (۳) پارانوئید (۴) خودشیفته
- ۱۳- کدام اختلال شخصیت، دوری‌گرایان افراطی‌اند؟  
 (۱) دوری‌گزین (۲) اسکیزوئید (۳) پارانوئید (۴) اسکیزوتایپی
- ۱۴- شیفته‌اشیای بی‌جان و مفاهیم ماوراء طبیعی و مجذوب‌نهضت‌های فلسفی، از ویژگی‌های کدام اختلال شخصیت است؟  
 (۱) پارانوئید (۲) نمایشی (۳) مرزی (۴) اسکیزوئید
- ۱۵- (استعاره غریب و استفاده از صنایع ادبی غیر معمول) در کدام اختلال روانی دیده می‌شود؟  
 (۱) اسکیزوفرنی (۲) اختلالات هذیانی (۳) اسکیزوئید (۴) مرزی

- ۱۶- بیماران کدام اختلال شخصیت، مدعی غیب‌بینی و داشتن قدرت‌های فکری‌اند؟  
 (۱) مرزی (۲) اسکیزوتایپی (۳) اسکیزوئید (۴) پارانوئید
- ۱۷- مبتلابان به کدام اختلال شخصیت، ظاهری طبیعی و حتی گرم و دوست‌داشتنی دارند؟  
 (۱) مرزی (۲) ضد اجتماعی (۳) وابسته (۴) اسکیزوئید
- ۱۸- شایع‌ترین اختلال شخصیت کدام است؟  
 (۱) ضد اجتماعی (۲) وسواسی - جبری (۳) مرزی (۴) منفعل - پرخاشگر
- ۱۹- رفتار خودتخریبی (مثل خودزنی) در کدام اختلال روانی شایع است؟  
 (۱) اسکیزوفرنی (۲) اختلالات تجزیه‌ای (۳) اختلال تبدیلی (۴) مرزی
- ۲۰- «شخصیت با استعداد» به مبتلابان به کدام اختلال شخصیت اطلاق می‌شود؟  
 (۱) ضد اجتماعی (۲) وابسته (۳) نمایشی (۴) مرزی
- ۲۱- برای درمان کسانی که رفتارهای شبه‌خودکشی (مثل خودزنی) دارند کدام درمان پیشنهاد می‌شود؟  
 (۱) تداعی آزاد (۲) حساسیت‌زدایی منظم (۳) رفتاردرمانی جدلی (۴) شناخت‌درمانی
- ۲۲- «همه دنیا صحنه نمایش است» این ویژگی کدام اختلال شخصیت است؟  
 (۱) پارانوئید (۲) اسکیزوئید (۳) هیستریانیک (۴) مرزی
- ۲۳- چه کسی خودشیفتگی را مرحله خاصی از رشد می‌دانست؟  
 (۱) فروید (۲) هورنای (۳) کوهات (۴) کرنبرگ
- ۲۴- خصیصه بالینی کدام اختلال «حساسیت مفرط به طرد شدن از سوی دیگران» است؟  
 (۱) اسکیزوئید (۲) مرزی (۳) نمایشی (۴) دوری‌گزین
- ۲۵- تفکر جادویی از ویژگی‌های اصلی کدام اختلال شخصیت است؟  
 (۱) مرزی (۲) پارانوئید (۳) اسکیزوئید (۴) اسکیزوتایپال
- ۲۶- کدام اختلال از نظر ژنتیک با اسکیزوفرنی، پیوند نشان داده است؟  
 (۱) اسکیزوتایپی (۲) مرزی (۳) اسکیزوئید (۴) پارانوئید
- ۲۷- ویژگی اصلی cluster A در اختلال شخصیت کدام است؟  
 (۱) غریب و نامتعارف بودن (۲) نامتعادل و هیجانی (۳) مضطرب و هراسان (۴) نمایشی و خودمحور
- ۲۸- ویژگی اصلی اختلال شخصیت مرزی کدام است؟  
 (۱) خودبزرگ‌بینی (۲) روی‌گردانی از انسان‌ها (۳) عدم حساسیت به احساس دیگران (۴) ناپایداری در خودانگاره
- ۲۹- مکانسیم دفاعی دنیوسازی عمدتاً از سوی کدام بیماران استفاده می‌شود؟  
 (۱) شخصیت مرزی (۲) شخصیت نمایشی (۳) شخصیت خودشیفته (۴) شخصیت اسکیزوئید
- ۳۰- نزدیک‌ترین اختلال «از لحاظ علائم» به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال کدام است؟  
 (۱) اسکیزوئید (۲) اسکیزوفرنی (۳) پارانوئید (۴) هیستریانیک



## فصل بیستم

## «اختلالات عصبی - شناختی»

## آزمون فصل بیستم

- ۱- مشخصه مشترک دمانس، دلیریوم و اختلالات نسیانی کدام است؟  
 (۱) اختلال حرکتی (۲) اختلال هشیاری (۳) تخریب شناخت (۴) توهم
- ۲- مشخصه دلیریوم کدام است؟  
 (۱) تخریب حمله (۲) اختلال هشیاری (۳) اختلال ادراکی (۴) تغییرات شناختی
- ۳- در مواردی که افراد را مستعد ابتلا به دلیریوم می‌کند، کدام گزینه نقش کمتری دارد؟  
 (۱) سن بالا (۲) جنس مذکر (۳) سن پایین (۴) جنس مؤنث
- ۴- تشخیص افتراقی دلیریوم و دمانس کدام است؟  
 (۱) دمانس شروع حادی دارد. (۲) دلیریوم، شروع مزمن دارد و در بلندمدت ایجاد می‌شود.  
 (۳) علائم دمانس ثبات بیشتری در طول زمان دارد. (۴) در دمانس، اختلال هشیاری دیده می‌شود.
- ۵- کدام یک از علائم زیر جزء علائم اصلی دمانس نیست؟  
 (۱) تخریب حافظه (۲) تخریب قضاوت (۳) اختلال موقعیت‌سنجی (۴) اختلال در تکلم
- ۶- شایع‌ترین نوع دمانس کدام نوع است؟  
 (۱) پارکینسون (۲) هانتینگتون (۳) بیماری پیک (۴) آلزایمر
- ۷- کدام عامل در بروز هانتینگتون مؤثر است؟  
 (۱) تخریب آمیگدال - کمبود دوپامین (۲) تخریب آمیگدال - کمبود گابا  
 (۳) تخریب هسته دمدار - کمبود دوپامین (۴) تخریب هسته دمدار - کمبود گابا
- ۸- کدام بیماری از نظر بالینی شبیه آلزایمر است و علائمی همچون توهم نیز دارد؟  
 (۱) دمانس عروقی (۲) بیماری جسم لوی (۳) پیک (۴) پارکینسون
- ۹- شایع‌ترین بیماری عصبی مزمن در جمعیت کلی کدام است؟  
 (۱) افسردگی (۲) صرع (۳) اضطراب (۴) MPD
- ۱۰- کدام یک از مناطق آناتومیک مغز در یادگیری نقش مهم‌تری دارند؟  
 (۱) هیپوکامپ (۲) ناحیه بروکا (۳) کورتکس اکسی‌پیتال (۴) کورتکس فرونتال
- ۱۱- گروه ژنی E4 و سطوح بالای آلومینیوم در بروز کدام اختلال مؤثر است؟  
 (۱) آلزایمر (۲) پیک (۳) پارکینسون (۴) کورساکوف
- ۱۲- کدام یک از موارد زیر برای تشخیص دلیریوم شاخص‌تر محسوب می‌شود؟  
 (۱) اختلال در خلق (۲) اختلال هشیاری (۳) اختلال در ادراک (۴) اختلال در تفکر
- ۱۳- بروز دلیریوم در کدام یک از بخش‌های زیر شایع است؟  
 (۱) جراحی عمومی (۲) سوختگی (۳) ICU (۴) روان‌پزشکی
- ۱۴- در سی‌تی اسکن یا MRI دمانس آلزایمر کدام علامت واضح‌تر است؟  
 (۱) توسعه بطن‌ها (۲) تفاوت حجم نیمکره‌ها (۳) کاهش حجم مناطق زیر قشری (۴) ورم کلی قشری
- ۱۵- کدام یک از اندام‌های مغزی زیر در فعالیت حرکتی نقش بیشتری دارد؟  
 (۱) هیپوکامپ (۲) بادامه (۳) شیار سینگولا (۴) هسته‌های قاعده‌ای

## فصل بیست و یکم

## «اختلالات مرتبط با مواد»

## آزمون فصل بیست و یکم

- ۱- یک عامل پیش‌بینی‌کننده برای وابستگی دارویی کدام است؟  
 (۱) تحصیلات بالا  
 (۲) سطح پایین تحصیلات و درآمد پایین  
 (۳) فرهنگ و تحصیلات  
 (۴) فرهنگ
- ۲- شایع‌ترین داروی مورد سوء مصرف کدام است؟  
 (۱) تریاک  
 (۲) هروئین  
 (۳) آمفتامین‌ها  
 (۴) ماری‌جوآنا
- ۳- نظریات جدید رویکرد سایکو دینامیک در مورد سوء مصرف مواد کدام است؟  
 (۱) معادل خودارضایی  
 (۲) مکانیسم دفاعی در مقابل همجنس‌گرایی  
 (۳) همانندسازی با والد همجنس  
 (۴) موارد ۱ و ۲
- ۴- بیشترین تأکید نظریات رفتاری در مورد سوء مصرف کدام است؟  
 (۱) شرطی‌سازی کلاسیک  
 (۲) مشاهده  
 (۳) رفتار موادجویی  
 (۴) شرطی‌سازی عامل
- ۵- مدار پاداش مغز در کدام ناحیه مغزی قرار دارد؟  
 (۱) لوب پیشانی  
 (۲) لیمبیک و عقده‌های پایه  
 (۳) نواحی قشری و لیمبیک  
 (۴) لوب گیجگاهی
- ۶- شایع‌ترین اختلال روانی مرتبط با اختلال سوء مصرف یا وابستگی به مواد کدام است؟  
 (۱) افسردگی  
 (۲) اختلال شخصیت ضداجتماعی  
 (۳) اضطراب  
 (۴) اختلالات سایکوتیک
- ۷- بعد از افسردگی، کدام اختلال را عامل پیش‌بینی‌کننده خودکشی دانسته‌اند؟  
 (۱) اسکیزوفرنی  
 (۲) اضطراب  
 (۳) سوء مصرف یا وابستگی به الکل  
 (۴) اختلالات سایکوتیک
- ۸- تأثیر بنزودیازپین‌ها همچون کدام ماده است؟  
 (۱) کافئین  
 (۲) الکل  
 (۳) نیکوتین  
 (۴) آمفتامین‌ها
- ۹- طبق DSM رایج‌ترین مضعف مغز کدام مورد است؟  
 (۱) مواد افیونی  
 (۲) حشیش  
 (۳) الکل  
 (۴) آمفتامین‌ها
- ۱۰- علامت کلاسیک ترک الکل کدام رفتار است؟  
 (۱) توهم  
 (۲) هذیان  
 (۳) رعشه  
 (۴) حملات تشنجی
- ۱۱- خصوصیت اصلی اختلال نسیانی پایدار ناشی از الکل کدام است؟  
 (۱) اختلال در حافظه بلندمدت  
 (۲) اختلال در حافظه کوتاه‌مدت  
 (۳) دلیریوم  
 (۴) دمانس
- ۱۲- نشانه بارز اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین کدام است؟  
 (۱) توهم  
 (۲) پارانوئا  
 (۳) پرواز بد  
 (۴) فلاشبک
- ۱۳- جزء اصلی حشیش کدام مورد است؟  
 (۱) GAD  
 (۲)  $\Delta^9$ -THC  
 (۳)  $D_2$   
 (۴) CAMP
- ۱۴- سندرم فقدان انگیزش مربوط به مصرف کدام ماده است؟  
 (۱) الکل  
 (۲) آمفتامین  
 (۳) حشیش  
 (۴) کوکائین
- ۱۵- شایع‌ترین عارضه مصرف LSD کدام است؟  
 (۱) سراسیمگی  
 (۲) پارانوئا  
 (۳) توهم  
 (۴) پرواز بد



## فصل بیست و دوم

### «اختلالات عصبی رشدی»

#### آزمون فصل بیست و دوم

۱- نشانه‌های ADHD باید قبل از چند سالگی ظاهر شود؟

- (۱) ۱۲ سالگی (۲) ۵ سالگی (۳) ۷ سالگی (۴) ۹ سالگی

۲- کدام یک از علائم زیر، از علائم و ویژگی‌های کودکان مبتلا به ADHD نیست؟

- (۱) تکانشگری (۲) بی‌ثباتی هیجانی (۳) جروبحث با والدین (۴) مشکلات تحصیلی

۳- لوکوس سرولئوس عمدتاً محل کدام یک از نورون‌های زیر است؟

- (۱) آدرنرژیک (۲) نورآدرنرژیک (۳) سروتونرژیک (۴) استیل کولینرژیک

۴- کاهش جریان خون مغز و کاهش میزان متابولیسم در لوب پیشانی در کدام یک از اختلالات زیر دیده می‌شود؟

- (۱) OCD (۲) ADHD (۳) Rett's (۴) agoraphobia

۵- ویژگی‌هایی همچون پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران، وابسته به سن، مربوط به کدام اختلال است؟

- (۱) شخصیت ضد اجتماعی (۲) سلوک (۳) ADHD (۴) توره

۶- وجه افتراق (تشخیص افتراقی) اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه کدام است؟

(۱) در اختلال سلوک، حقوق اساسی دیگران نقض می‌شود.

(۲) در سلوک، پرخاشگری دیده می‌شود.

(۳) در اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه حقوق اساسی دیگران نقض می‌شود.

(۴) در نافرمانی مقابله‌جویانه، پرخاشگری دیده می‌شود.

۷- خوردن مداوم مواد غیرمغذی و غیر خوراکی، ویژگی بارز کدام اختلال است؟

- (۱) Rett's (۲) Pica (۳) Rumination (۴) ADHD

۸- اختلال نشخوار معمولاً پس از چندماهگی شروع می‌شود؟

- (۱) یک‌ماهگی (۲) دو‌ماهگی (۳) سه‌ماهگی (۴) شش‌ماهگی

۹- وقوع تیک‌های صوتی و حرکتی در فرد که بیش از یک‌سال در فرد به وقوع بپیوندد، ویژگی کدام اختلال است؟

- (۱) تیک گذرا (۲) تیک صوتی یا حرکتی مزمن (۳) حرکات قالبی (۴) ژیل دولاتوره

۱۰- نابهنجاری‌های هسته‌های قاعده‌ای مغز در بروز کدام اختلال نقش دارد؟

- (۱) توره (۲) ADHD (۳) ODD (۴) Pica

۱۱- شایع‌ترین تیک در مبتلایان به اختلال توره کدام است؟

- (۱) غرغر کردن گلو (۲) سرفه کردن (۳) چشمک زدن (۴) دست تکان دادن

۱۲- یکی از مؤثرترین درمان‌های اختلال تیک، کدام نوع درمان است؟

- (۱) شرطی‌سازی کلاسیک (۲) شرطی‌سازی عامل (۳) فنون وارونه‌سازی (۴) مواجهه‌سازی

۱۳- برای تشخیص اختلال تیک گذرا، ویژگی‌ها نباید بیشتر از چه مدتی طول بکشد؟

- (۱) ۳ ماه (۲) ۱ سال (۳) ۲ سال (۴) ۳ سال

- ۱۴- برای تشخیص اختلال بی‌اختیاری مدفوع، حداقل سن کودک باید چند سال باشد؟  
 (۱) ۲ سال (۲) ۳ سال (۳) ۴ سال (۴) ۵ سال
- ۱۵- اضطراب جدایی در دوران شیرخوارگی خود را به صورت کدام گزینه زیر نشان می‌دهد؟  
 (۱) کوتولگی روانی - اجتماعی (۲) اختلال نشخوار (۳) افسردگی اتکایی (۴) اضطراب بیگانه
- ۱۶- مشکلات شدید رفتاری، سوء تغذیه، اختلال هورمون رشد از ویژگی‌های کدام اختلال است؟  
 (۱) ناتوانی تغذیه‌ای دوران کودکی (۲) Pica (۳) افسردگی اتکایی (۴) اضطراب جدایی
- ۱۷- روابط ناهنجار و آشفته والد - نوزاد می‌تواند در بروز کدام اختلال نقش داشته باشد؟  
 (۱) Pica (۲) کوتولگی روانی - اجتماعی (۳) ADHD (۴) OCD
- ۱۸- برای تشخیص اختلال بی‌اختیاری ادرار، حداقل سن کودک باید چند سال باشد؟  
 (۱) ۵ سال (۲) ۳ سال (۳) ۴ سال (۴) ۶ سال
- ۱۹- ADHD با کدام یک از اختلال‌های زیر رابطه‌ی نزدیکی دارد؟  
 (۱) X شکننده (۲) سندرم داون (۳) رت (۴) کلاین فلتز
- ۲۰- اختلال سلوک می‌تواند پیش‌آگهی برای کدام یک از اختلال‌های زیر باشد؟  
 (۱) ADHD (۲) antisocial personality (۳) OCD (۴) social phobia



## فصل بیست و سوم

### «اختلالات طیف اوتیسم»

#### آزمون فصل بیست و سوم

- ۱- کدام یک از اختلالات زیر جزء اختلالات فراگیر رشد نیست؟  
 (۱) اختلال فروپاشنده کودکی (۲) رت (۳) اختلال توره (۴) اسپرگر
- ۲- پژواک کلام، وارونگی ضمیرها و اصرار یکنواختی از مشخصه‌های کدام اختلال است؟  
 (۱) ADHD (۲) اوتیسم (۳) اسپرگر (۴) ژیل دولاتوره
- ۳- برای تشخیص اوتیسم، علائم باید تا قبل از چند سالگی بروز کند؟  
 (۱) ۱ سالگی (۲) ۳ سالگی (۳) ۵ سالگی (۴) ۶ سالگی
- ۴- کدام یک از علائم زیر جزء علائم اصلی اوتیسم نیست؟  
 (۱) ادا و اطوار (۲) رفتارهای قالبی (۳) پژواک گویی (۴) هذیان
- ۵- لئو کانر در بحث سبب‌شناسی اوتیسم، کدام عامل را در بروز اوتیسم مؤثر می‌داند؟  
 (۱) مادران یخچالی (۲) خانواده از هم‌گسیخته (۳) جدایی والدین (۴) اختلال زیستی
- ۶- کدام یک از اختلالات زیر با اوتیسم و بروز آن ارتباط دارد؟  
 (۱) داون (۲) توره (۳) X شکننده (۴) هارت ناپ
- ۷- اختلال در کدام ناحیه مغزی را در اختلال اوتیسم بااهمیت قلمداد کرده‌اند؟  
 (۱) لوب پیشانی (۲) لوب گیجگاهی (۳) لوب آهیانه (۴) لوب پس سری
- ۸- «نظریه ذهن» که برای بیان یکی از ویژگی‌های اوتیسم بیان شده، کدام است؟  
 (۱) عدم توجه به محرک‌های حسی (۲) نداشتن دوست صمیمی (۳) عدم درک احساسات و حالات روانی دیگران (۴) روابط خانوادگی مختل
- ۹- فراگیرترین نشانه اختلال اوتیسم کدام است؟  
 (۱) توهم و هذیان (۲) تأخیر یا فقدان کامل رشد کلامی (۳) رفتارهای قالبی (۴) عدم توجه به محرک‌های حسی
- ۱۰- کاهش رشد سر و از دست دادن مهارت‌های دستی هدفدار در اختلال رت به ترتیب در چه سنی رخ می‌دهد؟  
 (۱) ۳ تا ۳۰ ماهگی و ۲ تا ۱۲ ماهگی (۲) ۵ تا ۳۰ ماهگی و ۵ تا ۴۸ ماهگی (۳) ۵ تا ۴۸ ماهگی و ۵ تا ۳۰ ماهگی (۴) ۲ تا ۱۲ ماهگی و ۳ تا ۳۰ ماهگی
- ۱۱- در اختلال فروپاشنده کودکی، رشد در چند سال اول زندگی طبیعی است؟  
 (۱) ۶ ماهگی (۲) یک سالگی (۳) دو سالگی (۴) سه سالگی
- ۱۲- وجه تمایز (تشخیص افتراقی) اختلال اوتیسم و اسپرگر چیست؟  
 (۱) فقدان حرکات قالبی در اسپرگر (۲) فقدان کناره‌گیری اجتماعی در اسپرگر (۳) فقدان کناره‌گیری اجتماعی در اوتیسم (۴) فقدان تأخیر زبان در اسپرگر
- ۱۳- کدام انتقال‌دهنده، بیشترین ارتباط را با اوتیسم دارد؟  
 (۱) سروتونین (۲) دوپامین (۳) استیل کولین (۴) GABA
- ۱۴- کدام گزینه در مورد اختلال رت صادق است؟  
 (۱) اختلال رفتاری شبه‌اوتیسم (۲) اختلال عصبی فقط مخصوص اوتیسم (۳) اختلال رشدی شایع‌تر در پسران (۴) اختلال روانی شبه‌اسکیزوفرنی کودکان
- ۱۵- سندرم کانر به کدام اختلال زیر اطلاق می‌شود؟  
 (۱) کم‌توانی ذهنی (۲) اسکیزوفرنی خردسالان (۳) اوتیسم خردسالی (۴) افسردگی کودکان





## فصل بیست و چهارم

### «اختلالات دفعی»

#### آزمون فصل بیست و چهارم

کله ۱- میزان شیوع کدام اختلال در پسران بیشتر است؟

- (۱) بی‌اختیاری ادرار (۲) بی‌اختیاری مدفوع (۳) اختلالات خلقی (۴) اختلالات خواب

کله ۲- میزان شیوع اختلال دفع در سطح خانواده کدام است؟

- (۱) ۲۷ درصد (۲) ۴۵ درصد (۳) ۵۲/۳ درصد (۴) ۷۵ درصد

کله ۳- کدام نظریه پرداز فشار ادیبی را عاملی برای بروز اختلال دفع می‌داند؟

- (۱) سوز (۲) فروید (۳) آدلر (۴) کلاین

کله ۴- اگر بی‌اختیاری ادراری منجر به آسیب معنادار در عملکرد اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی شود، کدام درمان اولویت دارد؟

- (۱) رفتاری (۲) دارویی (۳) شناختی (۴) آرام سازی

کله ۵- شرطی شدن ناتوانی را در کدام مکتب علت اختلال دفع قلمداد می‌شود؟

- (۱) یادگیری (۲) رفتاری (۳) روان پویایی (۴) فردگرایی



## فصل بیست و پنجم

### «درآمدی بر کم‌توانی‌های ذهنی»

#### آزمون فصل بیست و پنجم

۱- علامت بارز کم‌توانی ذهنی کودکان کدام است؟

- (۱) نقص در توجه  
(۲) معلولیت‌های جسمی  
(۳) تأخیر در رشد زبان  
(۴) ناتوانی در انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه‌مدت به بلندمدت

۲- تشخیص علل کم‌توانی، در کدام نوع از کم‌توانی مشکل‌تر است؟

- (۱) خفیف (۲) متوسط (۳) شدید (۴) عمیق

۳- بهره هوشی کودکان کم‌توان ذهنی متوسط کدام است؟

- (۱) ۵۵- تا ۷۰ (۲) ۴۰- تا ۶۰ (۳) ۳۵- تا ۵۰ (۴) ۳۵- تا ۵۵- تا ۵۰

۴- DSM و AAMR به ترتیب هوشی کمتر از چند را به عنوان کم‌توانی ذهنی محسوب می‌کردند؟

- (۱) ۷۰- تا ۷۵ (۲) ۷۵- تا ۸۰ (۳) ۶۰- تا ۷۵ (۴) ۷۵- تا ۸۰

۵- ملاک‌های DSM برای تشخیص کم‌توانی ذهنی علاوه بر شروع قبل از ۱۸ سال چه بود؟

- (۱) IQ کمتر از ۸۰ یا ۲ انحراف معیار کمتر از متوسط  
(۲) IQ کمتر از ۷۵ یا ۳ انحراف معیار کمتر از متوسط  
(۳) IQ کمتر از ۷۰ یا ۲ انحراف معیار کمتر از متوسط  
(۴) IQ کمتر از ۷۰ یا ۳ انحراف معیار کمتر از متوسط

۶- برای تصمیم در مورد سپردن کودکی به مراکز ویژه کودکان استثنایی، باید از کدام آزمون استفاده کرد؟

- (۱) وکسلر کودکان (۲) شاخص وایلند (۳) آزمون ITPA (۴) رور شاخ

۷- در بروز کدام کم‌توانی ذهنی، عوامل روانی - اجتماعی مؤثرند؟

- (۱) خفیف (۲) متوسط (۳) شدید (۴) هر سه مورد

۸- «دانشمندان احمق» نام کدام نوع کم‌توانی ذهنی است؟

- (۱) خفیف (۲) متوسط (۳) شدید (۴) عمیق

۹- کدام نوع از کم‌توانی‌های ذهنی ۴٪ کل جمعیت عقب‌مانده‌ها را تشکیل می‌دهند؟

- (۱) خفیف (۲) متوسط (۳) شدید (۴) عمیق

۱۰- کودکان دیرآموز (IQ ۷۱ تا ۹۰) چند درصد از کودکان پیش‌دبستانی را تشکیل می‌دهند؟

- (۱) ۵٪ (۲) ۱۰٪ (۳) ۲۰٪ (۴) ۳۰٪

۱۱- در کدام یک از بیماری‌های زیر، بیش‌فعالی و کم‌توجهی شایع است؟

- (۱) X شکننده (۲) داون (۳) رت (۴) کلاین فلتز

۱۲- در کدام اختلال، خوردن تکانشی، پرخوری و چاقی شایع است؟

- (۱) پاتو (۲) ادوارد (۳) پرادر - ویلی (۴) رت

۱۳- بعد از سندرم داون، شایع‌ترین اختلالات کروموزومی و متابولیکی کدام است؟

- (۱) کلاین فلتز و هورلر (۲) رت و هورلر (۳) X شکننده و گالاکتوسی (۴) X شکننده و pku

۱۴- اختلال در کروموزوم‌های.....به کم‌توانی ذهنی شدیدتری منجر می‌شود.

- (۱) X (۲) Y (۳) جنسی (۴) معمولی

- ۱۵- نوعی آلودگی که از طریق گوشت خام و مواد نشاسته‌ای انتقال می‌یابد و نتیجه آن کم‌توانی ذهنی، نابینایی و تشنج است؟  
 (۱) تای ساکس (۲) توکسوپلاسموز (۳) گلاکتوسی (۴) نوروفیبروماتوز
- ۱۶- کدام نشانگان فقط در جنس مذکر دیده می‌شود؟  
 (۱) لش - نیهان (۲) X شکننده (۳) هیدروسفالی (۴) پرادر - ویلی
- ۱۷- آرایش کروموزومی سندرم کلاین فلتر کدام است؟  
 (۱) xxy (۲) xxyy (۳) xxx (۴) xyy
- ۱۸- چه کسی اختلال ایپی‌لوئیا را شرح داد؟  
 (۱) باندی (۲) سگن (۳) بورونویل (۴) بینه
- ۱۹- در چه سندرمی مردان مبتلا از نظر کروماتین مثبت هستند؟  
 (۱) کلاین فلتر (۲) هیدروسفال (۳) رت (۴) pku
- ۲۰- در کدام بیماری، کودکان از لحاظ رشد عمومی و جسمانی اختلالی ندارند ولی آنچه مهم است کم‌توانی ذهنی آنهاست؟  
 (۱) تای ساکس (۲) گلاکتوسی (۳) pku (۴) گارگولیسیم
- ۲۱- در درمان کدام بیماری از روش تزریق کلسیم و مصرف ویتامین D استفاده می‌شود؟  
 (۱) اسپاسموفیلی کودکان (۲) ایپی‌لوئیا (۳) تای ساکس (۴) هورلر
- ۲۲- مناسب‌ترین زمان تشخیص و درمان فنیل‌کتونوری (pku) کدام است؟  
 (۱) تشخیص حداکثر در هفته اول و درمان همزمان با آن  
 (۲) تشخیص در هفته دهم و درمان در ماه ۱۵ بعد از تولد  
 (۳) تشخیص در ۴ تا ۶ هفته‌گی و درمان تا ۱۵ ماه بعد از تولد  
 (۴) تشخیص و درمان همزمان با تولد کودک
- ۲۳- کدام اختلال مربوط به ذخیره موکوپولی‌ساکارید است؟  
 (۱) تای ساکس (۲) سندرم آپرت (۳) هانتز (۴) pku
- ۲۴- بیماری هورلر اختلال..... است.  
 (۱) کروموزومی (۲) ناشی از سوخت و ساز بدن (۳) ناشی از غده مترشحه داخلی (۴) علت ناشناخته
- ۲۵- تای ساکس یک اختلال..... در دسته مواد..... است که در آن مقدار زیادی ..... در یاخته‌های مغزی کودک تجمع می‌یابد.  
 (۱) متابولیکی ارثی - پروتئینی - لاکتوز (۲) متابولیکی مادرزادی - قندی - گلاکتوز  
 (۳) متابولیکی مادرزادی - قندی - هورلر (۴) متابولیکی ارثی / مادرزادی - چربی - گانگلیوزید
- ۲۶- کم‌توانی ذهنی خفیف، ضعف بیماری و شش‌انگشتی بودن کودک از علائم مشخصه کدام بیماری است؟  
 (۱) هورلر (۲) ترنر (۳) تای ساکس (۴) لورنس بیدل مون
- ۲۷- بزرگ بودن شکم، کوتاهی قد، گردن کوتاه، ابروان کلفت و کم‌توانی ذهنی از علائم بارز کدام اختلالات است؟  
 (۱) ویلسون (۲) کرتینیسیم (۳) گارگولیسیم (۴) X شکننده
- ۲۸- اختلال کوف مربوط به چه عاملی است؟  
 (۱) اختلال در سوخت‌وساز چربی‌ها (۲) پروتئین‌ها  
 (۳) مواد قندی (۴) اختلال در چربی و مواد قندی
- ۲۹- کدام بیماری نشانه‌های آناکسی، ضایعه پوستی و دانه زدن در برابر نور دارد؟  
 (۱) ترنر (۲) گلاکتوسی (۳) هورلر (۴) هارت ناپ
- ۳۰- آزمایش آمینوسنتز در چه زمانی از بارداری انجام می‌گیرد؟  
 (۱) هفته ۱۲ تا ۱۴ (۲) هفته ۱۶ (۳) هفته ۸ تا ۱۰ (۴) هفته ۲۴



- ۳۱- اختلال در کروموزوم ۱۳ یا ۱۵، میکروسفالی و گوش‌های پایین‌تر از محل طبیعی از ویژگی‌های کدام بیماری است؟  
 (۱) صدای گریه (۲) پاتو (۳) ادوارد (۴) هارت ناپ
- ۳۲- pku را نخستین بار چه کسی توصیف کرد؟  
 (۱) فولینگ (۲) کراپلین (۳) سگن (۴) ادوارد
- ۳۳- برای تشخیص کدام بیماری از آزمایش گاتری استفاده می‌شود؟  
 (۱) ترنر (۲) رت (۳) داون (۴) pku
- ۳۴- کدام یک از بیماری‌های زیر فقط در زنان مشاهده می‌شود؟  
 (۱) کلاین فلتز (۲) pku (۳) رت (۴) داون
- ۳۵- شایع‌ترین سندرم عصبی جلدی کدام است؟  
 (۱) هارت ناپ (۲) نوروفیبروماتوز (۳) لش - نیهان (۴) پاتو
- ۳۶- وجه مشخصه کدام اختلال زیر میلین‌زدایی ماده سفید مغز است؟  
 (۱) پاتو (۲) توکسوپلاسموز (۳) آدرنولکو دیستروفی (۴) لش - نیهان
- ۳۷- علت کدام بیماری کمبود تیروکسین است؟  
 (۱) میکزودم کودکان (۲) تتانی (۳) لورنس بیدلمون (۴) هورلر
- ۳۸- حملات تشنجی، انقباض عضلات دست و پا و حرکات پا مثل دوچرخه‌سواران، ویژگی کدام بیماری است؟  
 (۱) توکسمو پلاسموز (۲) تتانی (۳) هورلر (۴) هانتز
- ۳۹- عامل عمده نابهنجاری‌های مادرزادی و کم‌توانی ذهنی ناشی از عفونت، کدام است؟  
 (۱) سیفلیس (۲) سیتومگالی (۳) ایدز (۴) سرخجه
- ۴۰- کدام عارضه ناشی از ناسازگاری RH خونی است؟  
 (۱) کرن ایکترس (۲) توکسوپلاسموز (۳) لش - نیهان (۴) هارت ناپ

## فصل بیست و ششم

## «درمان‌های دارویی و الکتروشوک»

## آزمون فصل بیست و ششم

نکته: تست‌های این فصل برای داوطلبان وزارت بهداشت توصیه می‌شود.

۱- مصرف درازمدت داروهای ضد سایکوز غالباً به بروز علائم جسمی شبیه به کدام یک از اختلالات زیر منجر می‌شود؟

(۱) cerebrovascular accident (CVA) (۲) Parkinson

(۳) multiple sclersis (ms) (۴) Cerebral palsy (cp)

۲- مناسب‌ترین و رایج‌ترین دارو برای درمان سایکوزی که دلیریوم پدید می‌آید، کدام است؟

(۱) فلوکستین (۲) کلوزاپین (۳) لیتیوم (۴) هالوپریدول

۳- مصرف مداوم کدام یک از داروهای زیر، به ایجاد پدیده تحمل و وابستگی منجر خواهد شد؟

(۱) آلپرازولام (۲) بوپروپیون (۳) فلوئنازین (۴) فلوکستین

۴- کدام یک از موارد زیر در مورد کودکانی که داروی ریتالین مصرف می‌کنند، صحیح است؟

(۱) کاربرد آن در دوران پیش از مدرسه شایع‌تر است. (۲) در شروع درمان، بررسی قلب ضروری است.

(۳) داروی انتخابی کودکان مبتلا به اختلال conduct است. (۴) در طول دوره درمان هیچ‌گاه نباید دارو قطع شود.

۵- چنانچه برای یک بیمار اسکیزوفرنیک، هالوپریدول تجویز شود، انتظار پیدا شدن کدام عارضه دارویی وجود ندارد؟

(۱) قیافه ماسک (۲) دیسکینزی دیررس (۳) سرخوشی بیش از حد (۴) هیجان کنترل نشده

۶- کدام یک از عوارض زیر با مصرف داروی والپروات در درمان اختلال دو قطبی I ظاهر می‌شود؟

(۱) ریزش مو (۲) داء الصدف (پسیوریازیس) (۳) درم مخاطی (۴) پس‌اداری

۷- ریسپریدون آنتاگونیست ..... است.

(۱) دوپامین (۲) سروتونین (۳) گلوتامات (۴) استیل کولین

۸- کدام یک از داروهای زیر همراه با عوارض اکستراپیرامیدال نیست؟

(۱) کلروپرومازین (۲) هالوپریدول (۳) تورازین (۴) کلوزاپین

۹- درمان با داروهای ضد افسردگی می‌تواند کدام یک از موارد زیر را به دنبال داشته باشد؟

(۱) بروز مانیا در برخی بیماران (۲) حملات هراس (۳) افت عملکرد شناختی (۴) بی‌اشتهایی روان‌زاد

۱۰- کدام یک از داروهای ضد افسردگی، مهارکننده بازجذب سروتونین و نوراپی‌نفرین است؟

(۱) سیتانوپرام (۲) فلوکستین (۳) کلومی پرامین (۴) سرترالین



## فصل بیست و هفتم

### «تغییرات DSM»

#### آزمون فصل بیست و هفتم

۱- کدام فصل در DSM-5 جدید است؟

- (۱) تروماتیک (۲) عصبی رشدی (۳) عصبی شناختی (۴) کنترل تکانه

۲- اختلال دلبستگی واکنشی مربوط به کدام فصل DSM-5 می‌باشد؟

- (۱) تروماتیک (۲) کنترل تکانه (۳) عصبی رشدی (۴) اضطرابی

۳- اختلال پوست‌کنی در کدام طبقه مطالعه می‌شود؟

- (۱) وسواس (۲) کنترل تکانه (۳) اضطرابی (۴) عصبی رشدی

۴- اختلال آمیختگی اجتماعی مهارنشده سابقاً جزء کدام اختلال بود؟

- (۱) دلبستگی واکنشی (۲) اضطراب جدایی (۳) اضطراب فراگیر (۴) PTSD

۵- کدام اختلالات سابقاً جزئی از طبقه دوران کودکی بوده و در DSM-5 فصل مجزا است؟

- (۱) سلوک (۲) دفع (۳) سکوت انتخابی (۴) ADHD

۶- عنوان جدید اختلال نشانه‌ها کاردی عصبی به جای کدام اختلال مطرح شده است؟

- (۱) درد (۲) تبدیلی (۳) بریکه (۴) هیپوکندری

۷- اختلال درد نوع فرعی کدام اختلال محسوب می‌شود؟

- (۱) اضطراب بیساری (۲) علامت بدنی (۳) مونچاوزن (۴) تجزیه‌ای

۸- اختلال فرار روان‌زاد نوع فرعی کدام اختلال در DSM-5 است؟

- (۱) مسخ (۲) فراموشی تجزیه‌ای (۳) PTSD (۴) MPD

۹- تأکید بر مدل بعدی در کدام اختلالات کم‌رنگ‌تر است؟

- (۱) اسکیزوفرنی (۲) اوتیسم (۳) شخصیت (۴) عصبی شناختی

۱۰- عنوان عصبی شناختی در DSM-5 جایگزین کدام اختلال شده است؟

- (۱) عصبی رشدی (۲) اختلالات نسیانی (۳) دمانس (۴) دلیریوم

## فصل اول: رفتار نابهنجار

۱- گزینه «۳»      ۲- گزینه «۲»      ۳- گزینه «۲»      ۴- گزینه «۳»      ۵- گزینه «۲»

## فصل دوم: تاریخچه آسیب‌شناسی روانی

۱- گزینه «۲»      ۲- گزینه «۳»      ۳- گزینه «۱»      ۴- گزینه «۳»      ۵- گزینه «۲»  
 ۶- گزینه «۳»      ۷- گزینه «۴»      ۸- گزینه «۲»      ۹- گزینه «۱»      ۱۰- گزینه «۲»

## فصل سوم: ارزیابی

۱- گزینه «۱»      ۲- گزینه «۲»      ۳- گزینه «۲»      ۴- گزینه «۲»      ۵- گزینه «۳»  
 ۶- گزینه «۳»      ۷- گزینه «۲»      ۸- گزینه «۱»      ۹- گزینه «۳»      ۱۰- گزینه «۱»  
 ۱۱- گزینه «۱»      ۱۲- گزینه «۳»      ۱۳- گزینه «۳»      ۱۴- گزینه «۳»      ۱۵- گزینه «۴»  
 ۱۶- گزینه «۲»      ۱۷- گزینه «۳»      ۱۸- گزینه «۱»      ۱۹- گزینه «۴»      ۲۰- گزینه «۲»  
 ۲۱- گزینه «۱»      ۲۲- گزینه «۲»      ۲۳- گزینه «۴»      ۲۴- گزینه «۳»      ۲۵- گزینه «۴»

## فصل چهارم: تشخیص، طبقه‌بندی و درمان

۱- گزینه «۲»      ۲- گزینه «۳»      ۳- گزینه «۳»      ۴- گزینه «۴»      ۵- گزینه «۱»  
 ۶- گزینه «۲»      ۷- گزینه «۳»      ۸- گزینه «۳»      ۹- گزینه «۴»      ۱۰- گزینه «۲»

## فصل پنجم: علائم و نشانه‌ها در روان‌پزشکی

۱- گزینه «۳»      ۲- گزینه «۴»      ۳- گزینه «۲»      ۴- گزینه «۱»      ۵- گزینه «۲»  
 ۶- گزینه «۲»      ۷- گزینه «۲»      ۸- گزینه «۲»      ۹- گزینه «۴»      ۱۰- گزینه «۲»  
 ۱۱- گزینه «۱»      ۱۲- گزینه «۳»      ۱۳- گزینه «۴»      ۱۴- گزینه «۲»      ۱۵- گزینه «۱»  
 ۱۶- گزینه «۳»      ۱۷- گزینه «۴»      ۱۸- گزینه «۱»      ۱۹- گزینه «۲»      ۲۰- گزینه «۳»  
 ۲۱- گزینه «۴»      ۲۲- گزینه «۴»      ۲۳- گزینه «۲»      ۲۴- گزینه «۱»      ۲۵- گزینه «۳»

## فصل ششم: دیدگاه‌های نظری

۱- گزینه «۱»      ۲- گزینه «۱»      ۳- گزینه «۳»      ۴- گزینه «۳»      ۵- گزینه «۲»  
 ۶- گزینه «۱»      ۷- گزینه «۳»      ۸- گزینه «۴»      ۹- گزینه «۳»      ۱۰- گزینه «۳»  
 ۱۱- گزینه «۳»      ۱۲- گزینه «۲»      ۱۳- گزینه «۱»      ۱۴- گزینه «۱»      ۱۵- گزینه «۱»  
 ۱۶- گزینه «۱»      ۱۷- گزینه «۲»      ۱۸- گزینه «۳»      ۱۹- گزینه «۴»      ۲۰- گزینه «۱»

## فصل هفتم: مکانیسم‌های دفاعی

۱- گزینه «۱»      ۲- گزینه «۴»      ۳- گزینه «۳»      ۴- گزینه «۲»      ۵- گزینه «۱»  
 ۶- گزینه «۲»      ۷- گزینه «۳»      ۸- گزینه «۱»      ۹- گزینه «۴»      ۱۰- گزینه «۲»

## فصل هشتم: اختلالات اضطرابی

۱- گزینه «۲»      ۲- گزینه «۲»      ۳- گزینه «۳»      ۴- گزینه «۴»      ۵- گزینه «۳»  
 ۶- گزینه «۴»      ۷- گزینه «۲»      ۸- گزینه «۳»      ۹- گزینه «۳»      ۱۰- گزینه «۲»  
 ۱۱- گزینه «۱»      ۱۲- گزینه «۳»      ۱۳- گزینه «۲»      ۱۴- گزینه «۳»      ۱۵- گزینه «۳»

## فصل نهم: نشانه جسمانی و اختلالات مرتبط

۱- گزینه «۴»      ۲- گزینه «۱»      ۳- گزینه «۲»      ۴- گزینه «۳»      ۵- گزینه «۴»  
 ۶- گزینه «۱»      ۷- گزینه «۴»      ۸- گزینه «۱»      ۹- گزینه «۱»      ۱۰- گزینه «۲»  
 ۱۱- گزینه «۱»      ۱۲- گزینه «۲»      ۱۳- گزینه «۳»      ۱۴- گزینه «۱»      ۱۵- گزینه «۱»  
 ۱۶- گزینه «۲»      ۱۷- گزینه «۲»      ۱۸- گزینه «۱»      ۱۹- گزینه «۱»      ۲۰- گزینه «۴»

«۲۱- گزینه «۲»      «۲۲- گزینه «۳»      «۲۳- گزینه «۳»      «۲۴- گزینه «۲»      «۲۵- گزینه «۳»

#### فصل دهم: اختلالات تجزیه‌ای

«۱- گزینه «۴»      «۲- گزینه «۳»      «۳- گزینه «۱»      «۴- گزینه «۱»      «۵- گزینه «۱»  
 «۶- گزینه «۱»      «۷- گزینه «۱»      «۸- گزینه «۱»      «۹- گزینه «۳»      «۱۰- گزینه «۴»

#### فصل یازدهم: وسواس و اختلالات وابسته

«۱- گزینه «۲»      «۲- گزینه «۲»      «۳- گزینه «۲»      «۴- گزینه «۲»      «۵- گزینه «۲»  
 «۶- گزینه «۳»      «۷- گزینه «۳»      «۸- گزینه «۲»      «۹- گزینه «۳»      «۱۰- گزینه «۳»

#### فصل دوازدهم: اسکیزوفرنی «روان‌گسیختگی»

«۱- گزینه «۴»      «۲- گزینه «۱»      «۳- گزینه «۱»      «۴- گزینه «۲»      «۵- گزینه «۳»  
 «۶- گزینه «۴»      «۷- گزینه «۲»      «۸- گزینه «۱»      «۹- گزینه «۲»      «۱۰- گزینه «۴»  
 «۱۱- گزینه «۳»      «۱۲- گزینه «۳»      «۱۳- گزینه «۳»      «۱۴- گزینه «۲»      «۱۵- گزینه «۳»  
 «۱۶- گزینه «۲»      «۱۷- گزینه «۴»      «۱۸- گزینه «۲»      «۱۹- گزینه «۴»      «۲۰- گزینه «۱»  
 «۲۱- گزینه «۲»      «۲۲- گزینه «۱»      «۲۳- گزینه «۳»      «۲۴- گزینه «۱»      «۲۵- گزینه «۳»  
 «۲۶- گزینه «۱»      «۲۷- گزینه «۲»      «۲۸- گزینه «۲»      «۲۹- گزینه «۴»      «۳۰- گزینه «۴»  
 «۳۱- گزینه «۳»      «۳۲- گزینه «۳»      «۳۳- گزینه «۳»      «۳۴- گزینه «۲»      «۳۵- گزینه «۱»  
 «۳۶- گزینه «۴»      «۳۷- گزینه «۱»      «۳۸- گزینه «۴»      «۳۹- گزینه «۲»      «۴۰- گزینه «۴»

#### فصل سیزدهم: اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی و انواع آن

«۱- گزینه «۳»      «۲- گزینه «۲»      «۳- گزینه «۱»      «۴- گزینه «۲»      «۵- گزینه «۱»  
 «۶- گزینه «۳»      «۷- گزینه «۳»      «۸- گزینه «۴»      «۹- گزینه «۳»      «۱۰- گزینه «۴»  
 «۱۱- گزینه «۳»      «۱۲- گزینه «۳»      «۱۳- گزینه «۱»      «۱۴- گزینه «۳»      «۱۵- گزینه «۳»  
 «۱۶- گزینه «۴»      «۱۷- گزینه «۳»      «۱۸- گزینه «۲»      «۱۹- گزینه «۳»      «۲۰- گزینه «۴»

#### فصل چهاردهم: اختلالات جنسی

«۱- گزینه «۴»      «۲- گزینه «۴»      «۳- گزینه «۲»      «۴- گزینه «۴»      «۵- گزینه «۲»  
 «۶- گزینه «۴»      «۷- گزینه «۲»      «۸- گزینه «۳»      «۹- گزینه «۱»      «۱۰- گزینه «۴»  
 «۱۱- گزینه «۴»      «۱۲- گزینه «۲»      «۱۳- گزینه «۲»      «۱۴- گزینه «۱»      «۱۵- گزینه «۱»

#### فصل پانزدهم: اختلالات تغذیه و خوردن

«۱- گزینه «۴»      «۲- گزینه «۲»      «۳- گزینه «۱»      «۴- گزینه «۳»      «۵- گزینه «۱»  
 «۶- گزینه «۱»      «۷- گزینه «۳»      «۸- گزینه «۴»      «۹- گزینه «۲»      «۱۰- گزینه «۲»

#### فصل شانزدهم: اختلالات خواب

«۱- گزینه «۲»      «۲- گزینه «۳»      «۳- گزینه «۲»      «۴- گزینه «۳»      «۵- گزینه «۳»  
 «۶- گزینه «۲»      «۷- گزینه «۲»      «۸- گزینه «۱»      «۹- گزینه «۳»      «۱۰- گزینه «۴»  
 «۱۱- گزینه «۴»      «۱۲- گزینه «۳»      «۱۳- گزینه «۲»      «۱۴- گزینه «۱»      «۱۵- گزینه «۲»

#### فصل هفدهم: اختلالات اخلاک، کنترل تکانه و سلوک

«۱- گزینه «۲»      «۲- گزینه «۴»      «۳- گزینه «۴»      «۴- گزینه «۳»      «۵- گزینه «۱»  
 «۶- گزینه «۲»      «۷- گزینه «۳»      «۸- گزینه «۴»      «۹- گزینه «۱»      «۱۰- گزینه «۲»

#### فصل هجدهم: اختلالات مرتبط با آسیب (تروما) و عامل استرس‌زا

«۱- گزینه «۴»      «۲- گزینه «۳»      «۳- گزینه «۳»      «۴- گزینه «۱»      «۵- گزینه «۴»  
 «۶- گزینه «۱»      «۷- گزینه «۲»      «۸- گزینه «۲»      «۹- گزینه «۲»      «۱۰- گزینه «۲»

#### فصل نوزدهم: اختلالات شخصیت





۱- گزینه «۳»	۲- گزینه «۳»	۳- گزینه «۲»	۴- گزینه «۳»	۵- گزینه «۲»
۶- گزینه «۴»	۷- گزینه «۲»	۸- گزینه «۳»	۹- گزینه «۴»	۱۰- گزینه «۳»
۱۱- گزینه «۱»	۱۲- گزینه «۱»	۱۳- گزینه «۲»	۱۴- گزینه «۴»	۱۵- گزینه «۳»
۱۶- گزینه «۲»	۱۷- گزینه «۲»	۱۸- گزینه «۳»	۱۹- گزینه «۴»	۲۰- گزینه «۴»
۲۱- گزینه «۳»	۲۲- گزینه «۳»	۲۳- گزینه «۳»	۲۴- گزینه «۴»	۲۵- گزینه «۴»
۲۶- گزینه «۱»	۲۷- گزینه «۱»	۲۸- گزینه «۴»	۲۹- گزینه «۱»	۳۰- گزینه «۲»

#### فصل بیستم: اختلالات عصبی - شناختی

۱- گزینه «۳»	۲- گزینه «۲»	۳- گزینه «۴»	۴- گزینه «۳»	۵- گزینه «۳»
۶- گزینه «۴»	۷- گزینه «۴»	۸- گزینه «۳»	۹- گزینه «۲»	۱۰- گزینه «۱»
۱۱- گزینه «۱»	۱۲- گزینه «۲»	۱۳- گزینه «۳»	۱۴- گزینه «۲»	۱۵- گزینه «۴»

#### فصل بیست و یکم: اختلالات مرتبط با مواد

۱- گزینه «۲»	۲- گزینه «۴»	۳- گزینه «۴»	۴- گزینه «۳»	۵- گزینه «۲»
۶- گزینه «۲»	۷- گزینه «۳»	۸- گزینه «۲»	۹- گزینه «۳»	۱۰- گزینه «۴»
۱۱- گزینه «۲»	۱۲- گزینه «۲»	۱۳- گزینه «۲»	۱۴- گزینه «۳»	۱۵- گزینه «۴»

#### فصل بیست و دوم: اختلالات عصبی - رشدی

۱- گزینه «۱»	۲- گزینه «۳»	۳- گزینه «۲»	۴- گزینه «۲»	۵- گزینه «۲»
۶- گزینه «۲»	۷- گزینه «۲»	۸- گزینه «۳»	۹- گزینه «۴»	۱۰- گزینه «۱»
۱۱- گزینه «۳»	۱۲- گزینه «۳»	۱۳- گزینه «۲»	۱۴- گزینه «۳»	۱۵- گزینه «۴»
۱۶- گزینه «۳»	۱۷- گزینه «۲»	۱۸- گزینه «۱»	۱۹- گزینه «۱»	۲۰- گزینه «۲»

#### فصل بیست و سوم: اختلالات طیف اوتیسم

۱- گزینه «۳»	۲- گزینه «۲»	۳- گزینه «۲»	۴- گزینه «۴»	۵- گزینه «۱»
۶- گزینه «۳»	۷- گزینه «۱»	۸- گزینه «۳»	۹- گزینه «۲»	۱۰- گزینه «۳»
۱۱- گزینه «۴»	۱۲- گزینه «۴»	۱۳- گزینه «۱»	۱۴- گزینه «۱»	۱۵- گزینه «۳»

#### فصل بیست و چهارم: اختلالات دفعی

۱- گزینه «۲»	۲- گزینه «۳»	۳- گزینه «۱»	۴- گزینه «۲»	۵- گزینه «۳»
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### فصل بیست و پنجم: درآمدی بر کم توانی های ذهنی

۱- گزینه «۳»	۲- گزینه «۱»	۳- گزینه «۴»	۴- گزینه «۱»	۵- گزینه «۲»
۶- گزینه «۲»	۷- گزینه «۱»	۸- گزینه «۳»	۹- گزینه «۳»	۱۰- گزینه «۲»
۱۱- گزینه «۱»	۱۲- گزینه «۳»	۱۳- گزینه «۴»	۱۴- گزینه «۴»	۱۵- گزینه «۲»
۱۶- گزینه «۱»	۱۷- گزینه «۱»	۱۸- گزینه «۳»	۱۹- گزینه «۱»	۲۰- گزینه «۳»
۲۱- گزینه «۱»	۲۲- گزینه «۳»	۲۳- گزینه «۳»	۲۴- گزینه «۲»	۲۵- گزینه «۴»
۲۶- گزینه «۴»	۲۷- گزینه «۳»	۲۸- گزینه «۱»	۲۹- گزینه «۴»	۳۰- گزینه «۲»
۳۱- گزینه «۲»	۳۲- گزینه «۱»	۳۳- گزینه «۴»	۳۴- گزینه «۳»	۳۵- گزینه «۲»
۳۶- گزینه «۳»	۳۷- گزینه «۱»	۳۸- گزینه «۲»	۳۹- گزینه «۴»	۴۰- گزینه «۱»

#### فصل بیست و ششم: درمان های دارویی و الکتروشوک

۱- گزینه «۲»	۲- گزینه «۴»	۳- گزینه «۱»	۴- گزینه «۲»	۵- گزینه «۳»
۶- گزینه «۱»	۷- گزینه «۱»	۸- گزینه «۴»	۹- گزینه «۱»	۱۰- گزینه «۳»

#### فصل بیست و هفتم: تغییرات DSM

۱- گزینه «۱»	۲- گزینه «۱»	۳- گزینه «۱»	۴- گزینه «۱»	۵- گزینه «۲»
۶- گزینه «۲»	۷- گزینه «۲»	۸- گزینه «۲»	۹- گزینه «۳»	۱۰- گزینه «۳»